

کد کنترل

391

A

# آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمکن) – سال ۱۴۰۰

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه

۹۹/۱۲/۱۵



اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.  
امام خمینی (ره)

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  
سازمان سنجش آموزش کشور

رشته علوم و مهندسی شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان – (کد ۲۴۴۴)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۲۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۸۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: – اکولوژی و ماهی‌شناسی – تکثیر و پرورش تکمیلی (ماهی، آبزیان و غذای زنده) – مدیریت آبزی پروری (بهداشتی، ژنتیکی و تغذیه، فیزیولوژی آبزیان)	۸۰	۱	۸۰

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

\* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب ..... با شماره داوطلبی ..... با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤالات و پائین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

- ۱ نقش غده راست روده‌ای (Rectal gland) در کوسه ماهی، کدام است؟
- ۱) انبار کردن مواد غیرقابل گوارش
  - ۲) تنظیم دوره شبانه روزی
  - ۳) جلوگیری از تجزیه پروتئین
  - ۴) تنظیم نمک خون
- در کدام جنس ماهی، نرها تخم را پس از لفاح داخل دهان نگه می‌دارند؟
- ۱) گربه ماهی (*Arius*)
  - ۲) نی ماهی (*Sygnathus*)
  - ۳) اسبک ماهی (*Hypocampus*)
  - ۴) لوله ماهی (*Solenostomus*)
- ۳ کدام یک از جنس‌های شگ‌ماهی شکلان (Clupeiformes) در حوضه دریای خزر یافت می‌شود؟
- ۱) *Chirocentrus*
  - ۲) *Ilisha*
  - ۳) *Alosa*
  - ۴) *Thryssa*
- ۴ کدام زیر راسته آرایه *Anguilliformes* فاقد استخوان‌های آبششی، کيسه شنا، اتصال جمجمه توسط یک مفصل به هیوماندیبولا ر و باله دمی (یا بسیار تحلیل یافته) است؟
- ۱) *Moringuoidei*
  - ۲) *Congroidei*
  - ۳) *Anguilloidei*
  - ۴) *Saccopharyngoidae*
- ۵ کدام جنس کپور ماهیان خانواده Labeoninae، دارای پراکنش بیشتری در ۱۹ حوضه آبهای داخلی ایران هستند؟
- ۱) *Cobitis*
  - ۲) *Barilius*
  - ۳) *Bangana*
  - ۴) *Cyprinion*
- ۶ کدام یک از استخوان‌ها، سقف دهان را در ماهیان تشکیل می‌دهند؟
- ۱) قاعده‌ای لامی
  - ۲) مربعی
  - ۳) پروانه‌ای - گوشی
  - ۴) رجلی داخلی
- ۷ کدام ماهیچه، وظیفه بستن سرپوش آبششی را در کپور ماهیان بر عهده دارد؟
- ۱) *Adductor operculi*
  - ۲) *Protractor hyoidei*
  - ۳) *Dilatator operculi*
  - ۴) *Levator operculi*
- ۸ در کوسه ماهی لیمویی (*Negaprion brevirostris*)، لارو در مرحله نهایی رشد در درون کدام اندام، تکوین می‌یابد؟
- ۱) کانال مولر
  - ۲) کلواک
  - ۳) کانال ولف
  - ۴) درون کيسه تخمی شاخی شکل
- ۹ کدام یک از عملکردهای زیستی، در افزایش شناوری ماهیان مؤثر است؟
- ۱) ذخیره چربی اسکوامین در کبد کپور ماهیان
  - ۲) تغییر حجم کيسه شنا و باله دمی هتروسرک در کوسه ماهیان
  - ۳) جایگزینی یون‌های سبک به‌وسیله یون‌های سنگین در ساختار اسکلتی
  - ۴) توسعه شکل بدن در ماهیان پلاژیک

- ۱۰ محققی با استفاده از کلید شناسایی می‌خواهد، گونه‌ای را شناسایی کند. با توجه اطلاعات کلید شناسایی گونه فوق به *Capoeta aculeata* بیشترین شباهت را دارد ولی اختلافاتی نیز در ویژگی‌های ریختی با این گونه مشاهده می‌شود. محقق برای گزارش صحیح نام علمی این نمونه باید کدام‌یک از نام‌ها را استفاده کند؟
- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <i>Capoeta aff. aculeata</i> (۲) | <i>Capoeta cf. aculeata</i> (۱)  |
| <i>Capoeta aculeata</i> (۴)      | <i>Capoeta var. aculeata</i> (۳) |
- ۱۱ اکوتب (Ecotype) کدام است؟
- (۱) گونه‌های جدیدی که در اثر واگرایی سازشی ایجاد می‌شوند.
  - (۲) نتیجه پاسخ ژنتیکی یک گونه به یک بستر زیست خاص است.
  - (۳) موجوداتی با اجداد مشترک که به زیستگاه‌های متفاوت مهاجرت کرده‌اند.
  - (۴) دودمان‌های مختلفی که به محیط مشابه سازش یافته و ویژگی‌های مشابهی نشان می‌دهند.
- ۱۲ کدام‌یک از مفاهیم، توصیف‌کننده جمعیت‌هایی است که به‌وسیله موائع جغرافیایی از هم جدا شده و قادر به تبادل ژن نیستند؟
- (۱) پاراپاتریک
  - (۲) سیمپاتریک
  - (۳) جزیره اکولوژیک
  - (۴) آلوپاتریک
- ۱۳ در کدام‌یک از انواع سواحل، تنوع گونه‌ای کمتر مشاهده می‌شود؟
- (۱) سنگلاхи
  - (۲) صخره‌ای
  - (۳) گلی
  - (۴) مرجانی
- ۱۴ عامل اصلی محدودکننده رشد فیتوپلانکتون‌ها در اکوسیستم‌های دریایی و اقیانوسی، کدام نوع ترکیبات هستند؟
- (۱) نیتروژن
  - (۲) فسفر
  - (۳) دی‌اکسیدکربن محلول
  - (۴) کلسیم
- ۱۵ کدام‌یک از روش‌های غیرپارامتریک، محاسبه غنای گونه‌ای براساس تکرار گونه‌های نادر مشاهده شده در جامعه استوار است؟
- (۱) برآورد منحنی مساحت - گونه
  - (۲) منحنی بوتستراپ
  - (۳) برآورد جک نایف
  - (۴) ریرفکشن
- ۱۶ در مطالعه تنوع گونه‌ای، براساس الگوی تلاقی غذایی در اکوسیستم، کدام سطح باید برای مطالعه مدنظر قرار بگیرد؟
- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <i>Assemblage</i> (۲) | <i>Guilds</i> (۱)          |
| <i>Ensembles</i> (۴)  | <i>Local community</i> (۳) |
- ۱۷ در مقایسه تشابه تنوع زیستی اکوسیستم‌ها، معیارهای تشابه مورد استفاده باید واجد کدام ویژگی باشند؟
- (۱) وجود دامنه عددی نامحدود براساس درجه تنوع
  - (۲) وزن‌دهی بیشتر به گونه‌های همتا
  - (۳) عدم وابسته بودن به تعداد گونه
  - (۴) وابسته بودن به اندازه نمونه‌برداری
- ۱۸ میزان تنفس، تولید خالص و تولید ناخالص، به ترتیب در مراحل اولیه و انتهایی توالی دارای چه تغییراتی هستند؟
- (۱) (میزان تنفس = زیاد، کم) - (تولید خالص = کم، زیاد) - (تولید ناخالص = زیاد، کم)
  - (۲) (میزان تنفس = کم، کم) - (تولید خالص = کم، کم) - (تولید ناخالص = کم، کم)
  - (۳) (میزان تنفس = کم، زیاد) - (تولید خالص = زیاد، کم) - (تولید ناخالص = کم، زیاد)
  - (۴) (میزان تنفس = زیاد، زیاد) - (تولید خالص = زیاد، زیاد) - (تولید ناخالص = زیاد، زیاد)

- ۱۹- پدیده بزرگنمایی بیولوژیکی (Biological magnification) به کدام معنا است؟
- ۱) حالتی که رشد افراد جمعیت یک گونه به طور غیرطبیعی افزایش پیدا کند.
  - ۲) حالتی که تعداد افراد جمعیت یک گونه به طور غیرطبیعی افزایش پیدا کند.
  - ۳) حالتی که یک ماده آلوده کننده در آب افزایش پیدا کند.
  - ۴) حالتی که یک ماده آلوده کننده به تدریج در هر سطح زنجیره غذایی از نظر غلظت افزایش پیدا کند.
- ۲۰- طبق اصل برگمن و آلن هرچه از استوا به طرف عرض‌های جغرافیایی بالا برویم، جثه بدن جانوران خون‌گرم مشابه می‌یابد و اندازه اندام‌های انتهایی آن‌ها نظیر پا، دم و پوزه ..... می‌شود.
- ۱) کاهش - بلندتر      ۲) افزایش - کوتاه‌تر      ۳) افزایش - بلندتر      ۴) کاهش - کوتاه‌تر
- ۲۱- انواع متداول هورمون‌های مورد استفاده در القاء تخم ریزی ماهیان، کدام موارد هستند؟
- ۱) رهاسازی گنادوترپین، برخی استروئیدهای جنسی      ۲) بازدارنده گنادوترپین، دوپامین
  - ۳) تیروکسین، GH      ۴) دوپامین
- ۲۲- از مزایای استفاده از روش رسانش پایدار هورمون در ماهیان کدام است؟
- ۱) ارزان‌بودن      ۲) استرس پایدار      ۳) عدم نیاز به نیروی ماهر      ۴) اثر طولانی مدت
- ۲۳- در سیستم رسانش پایدار هورمون در ماهیان، PLA کدام است؟
- ۱) مخلوط GnRH با پلیمر و اسید گلوتامیک
  - ۲) نانو ذره کیتوزان حاوی هورمون GnRH
  - ۳) نانو ذره حاوی پلیمر به قطر ۴۰۰-۲۰۰ همراه با هورمون در ماتریکس آن
  - ۴) میکروسفری به قطر ۵-۲۰۰ میکرون از پلیمر و اسیدلاکتیک همراه با هورمون در ماتریکس آن
- ۲۴- در تعیین جنسیت ماهیان خاویاری، کدام روش اجرایی در کمترین سن ماهی، نتیجه را مشخص می‌کند؟
- ۱) اندازه گیری هورمون جنسی      ۲) آندوسکوپی
  - ۳) لاپاراسکوپی      ۴) اولترا سونوگرافی
- ۲۵- مراحل رسیدگی و تخم ریزی ماهیان خاویاری در طبیعت (به ترتیب از چپ به راست)، کدام موارد هستند؟
- ۱) GVM, GVBD, Ovulation, Spawning, Post VTG
  - ۲) Ovulation, GVBD, GVM, Spawning, Post VTG
  - ۳) GVM, Post VTG, GVBD Spawning, Ovulation
  - ۴) Post VTG, GVM, GVBD, Ovulation, Spawning
- ۲۶- «حوضچه‌های کورینسکی» کدام نوع حوضچه‌ها هستند؟
- ۱) نگهداری مولдин ماهیان خاویاری برای آماده سازی القاء تکثیر
  - ۲) مدور برای القای تکثیر کپور ماهیان چینی
  - ۳) بتونی برای آماده سازی تکثیر کپور وحشی
  - ۴) فایبر‌گلاس برای القاء تکثیر ماهی کفال
- ۲۷- عوامل جلوگیری از Polyspermy در ماهیان، شامل کدام موارد است؟
- ۱) granulosa-theca
  - ۲) fertilization cone-cortical alveoli
  - ۳) zona layer internal-zona layer external
  - ۴) oolemma-melanin layer

- ۲۸- محلول **GnRH-FIA** که در القاء تکثیر ماهیان به کار می‌رود، کدام است؟
- (۱) GnRH حل شده در محلول آب مقطر به علاوه نانو ذره کیتوزان
  - (۲) GnRH حل شده در محلول آب مقطر به علاوه حجم مساوی اسید گلاتامیک
  - (۳) GnRH حل شده در محلول نمک حجم مساوی از ادجوانت
  - (۴) GnRH حل شده در محلول سرم فیزیولوژی به علاوه حجم مساوی از پلیمر
- ۲۹- بعداز تزریق دوم هورمون در تکثیر ماهیان دامنه «مدت زمان تا تخم‌ریزی، با افزایش درجه حرارت آب استخرا نگهداری چه تغییری می‌یابد؟
- (۱) کاهش
  - (۲) افزایش
  - (۳) حرکت سینوسی
  - (۴) مرتبط نیست
- ۳۰- از معاایت استفاده از هورمون **GnRH** در القاء تکثیر ماهیان، کدام مورد است؟
- (۱) تجزیه سریع
  - (۲) ژنریک بودن
  - (۳) سنتز آسان
  - (۴) حذف توسط آنتی‌بادی‌ها
- ۳۱- در صنعت آبزی پروری، **Cryopreservation** کدام مورد است؟
- (۱) انجماد فوق العاده سریع و شیشه‌ای اسپرم در ازت مایع
  - (۲) سرماده‌ی اسپرم در فریزر  $-80^{\circ}\text{C}$
  - (۳) سرماده‌ی اسپرم در یخچال
  - (۴) انجماد‌کنند اسپرم ماهی در ازت مایع
- ۳۲- کدام گزینه، روش **Invitro** در مطالعات تخمک ماهیان است؟
- (۱) مطالعه تخمک با استفاده از اسپکتروفتومتری
  - (۲) کشت تخمک‌ها در خارج از بدن ماهی در محیط کشت
  - (۳) تکه‌برداری از تخدمان ماهی
  - (۴) جداسازی تخمک از بافت‌های نگهدارنده آن
- ۳۳- جهت رفع چسبندگی تخم ماهیان پس از لقاح می‌توان از کدام آنزیم استفاده نمود؟
- (۱) دی‌ساقاریداز
  - (۲) تریپسین
  - (۳) آمیلار
  - (۴) استراز
- ۳۴- از کدام هورمون‌های جنسی برای تشخیص جنسیت ماهیان خاویاری، در سالهای ابتدایی رشد آن‌ها استفاده می‌شود؟
- (۱) استرادیول (E<sub>2</sub>) و تستوسترون
  - (۲) 11KT و پروژسترون
  - (۳) DHP و استروژن
  - (۴) استرادیول و DHP
- ۳۵- افزایش کدام مورد از اثرات قطع پایه چشمی در می‌گو است؟
- (۱) قطر تخمک رهاشده
  - (۲) فاصله بین هر تخم ریزی
  - (۳) دفعات تخم‌ریزی در هر فصل تولید مثلی
  - (۴) هماوری در هر تخم‌ریزی
- ۳۶- مهم‌ترین نشانه بستر استخر آلوده در مزرعه پرورش می‌گو، کدام است؟
- (۱) بوی نامطبوع استخر
  - (۲) تجمع می‌گوها در ورودی و خروجی استخر
  - (۳) رشد شدید لب به لب در کف استخر
  - (۴) تجمع می‌گوها در کناره‌های استخر
- ۳۷- کدام گزینه در مورد اسپرم می‌گوها، صحیح است؟
- (۱) نداشتن قابلیت تحرک
  - (۲) دارا بودن آکروزوم
  - (۳) قدرت زنده ماندن در آب تا چند روز
  - (۴) آزادسازی از بند سوم شکمی در زمان تخم‌ریزی
- ۳۸- کدامیک از ضمایم بدن می‌گوهای خانواده، پنائیده گونوپود جنس نر هستند؟
- (۱) پاهای شنای سوم و چهارم
  - (۲) پاهای حرکتی چهارم و پنجم
  - (۳) پاهای شنای اول و دوم
  - (۴) پاهای حرکتی سوم و چهارم

- ۳۹- در کدام گروه از میگوها، جفت‌گیری لازمه رسیدگی نهایی تخمک‌ها است؟
- (۱) تلیکوم باز      (۲) تلیکوم بسته      (۳) آب شیرین      (۴) آب شور
- ۴۰- در کدام روش پرورش میگوهای دریایی، اندازه استخراها ۱۰ هکتار و غذادهی کاملاً به صورت دستی است؟
- (۱) فوق متراکم      (۲) گسترده      (۳) نیمه متراکم      (۴) متراکم
- ۴۱- بهترین مرحله رسیدگی جنسی میگوهای دریایی، مولد ماده برای قطع پایه چشمی، کدام گزینه است؟
- (۱) اول      (۲) دوم      (۳) سوم      (۴) چهارم
- ۴۲- دو میگوهای آب شیرین تخم در کدام مرحله تکوینی جنین تفریخ می‌شود؟
- (۱) پست لارو      (۲) زوا      (۳) ناپلی      (۴) مایسیس
- ۴۳- ترتیب مراحل لاروی صدف‌های دوکفه‌ای از راست به چپ کدام گزینه است؟
- (۱) ولیگر - اسپت - تروکوفور      (۲) تروکوفور - اسپت - ولیگر      (۳) ولیگر - تروکوفور - اسپت      (۴) تروکوفور - ولیگر - اسپت
- ۴۴- کدام هورمون نقش اصلی تنظیم متابولیسم و قند خون را در سخت پوستان عالی دارد؟
- (۱) GIH      (۲) CHH      (۳) MIH      (۴) MF
- ۴۵- مرحله تأخیر «Lag phase» در کشت جلبکی به کدام معنا است؟
- (۱) رشد به دلیل آلودگی محیط      (۲) کاهش مواد مغذی محیط کشت      (۳) زمان لازم برای انتباطق با شرایط جدید      (۴) قدرت تولید مثل جلبک
- ۴۶- غنی‌سازی روتیفرها با امولسیون چربی منجر به کدام مورد می‌شود؟
- (۱) هزینه بالا      (۲) کاهش قدرت تنفس      (۳) چسبیدن روتیفرها به یکدیگر      (۴) تولید ناگهانی جمعیت
- ۴۷- مهم‌ترین محدودیت غنی‌سازی ناپلی آرتمیا کدام است؟
- (۱) هزینه بالا      (۲) تلفات در حین غنی‌سازی      (۳) کاهش ارزش غذایی      (۴) افزایش اندازه
- ۴۸- توالی اندازه غذاهای زنده مورد استفاده در تغذیه لارو آبزیان از راست به چپ، کدام است؟
- (۱) دیاتومه‌ها - فلاژله‌ها - روتیفرها - ناپلیوس آرتمیا      (۲) روتیفر - فلاژله‌ها - دیاتومه‌ها - ناپلیوس آرتمیا      (۳) ناپلیوس آرتمیا - روتیفر - فلاژله‌ها - دیاتومه‌ها      (۴) روتیفرها - ناپلیوس آرتمیا - دیاتومه‌ها - فلاژله‌ها
- ۴۹- آرتمیا پس از ..... بار پوست‌اندازی، به مرحله ..... می‌رسد.
- (۱) ۱۵-اینستار ۱۵      (۲) ۱۵-اینستار ۱۰      (۳) ۱۰-اینستار ۱۵      (۴) ۱۰-اینستار ۱۰
- ۵۰- مهم‌ترین جلبک جهت تغذیه غذای اولیه میگویی دریایی کدام است؟
- (۱) کلرلا      (۲) اسکلوتنوما      (۳) سندهدموس      (۴) دونالیلا
- ۵۱- چرا در کپور ماهیان تزریق یک مرحله‌ای GnRHa برخلاف آزادماهیان که نیاز به تزریق مکرر دارند، در اوولاسیون مؤثر است؟
- (۱) نزدیک‌تر بودن ساختار GnRH سنتتیک به GnRH طبیعی کپور ماهیان      (۲) قوی بودن سیستم دوپامینرژیک در آزاد ماهیان      (۳) قوی بودن سیستم دوپامینرژیک در کپور ماهیان      (۴) کوتاه‌تر بودن دوره بلوغ تخمک در کپور ماهیان

- ۵۲- محل ترشح هورمون رسیدگی نهایی تخمک **MIH**, کجا است؟
- ۱) سلول‌های گرانولوزا تخمک
  - ۲) سلول‌های تکای تخمک
  - ۳) لایدیگ
  - ۴) سرتولی
- ۵۳- واکنش کورتیکال تخمک ماهیان در اثر کدام مورد، ایجاد می‌شود؟
- ۱) ورود محتویات هسته به سیتوپلاسم در اثر شکسته شدن دیواره هسته
  - ۲) آزادشدن محتویات ساکاریدی به داخل فضای پری‌ویتلین
  - ۳) رهاسازی پروتئین خاص در سیتوپلاسم تخمک
  - ۴) شکسته شدن دیواره هسته تخمک در زمان رسیدگی نهایی
- ۵۴- آنزیم‌های پروتئاز در پانکراس دستگاه گوارش ماهیان، کدام موارد هستند؟
- ۱) آمینوپیتیداز، تری‌پیتیداز، کتیناز
  - ۲) تریپسین، کیموتیریپسین، کربوکسی‌پیتیداز
  - ۳) پیپسین، آمینوپیتیداز، استراز
  - ۴) آمیلازه، دی‌ساکاریداز، پیپسین
- ۵۵- دو هورمونی که در زمان مهاجرت ماهیان مولد آنادروموس به رودخانه‌ها به حداکثر می‌رسند، کدام موارد هستند؟
- ۱) کورتیزون و پرولودکتین
  - ۲) استروژن و دی‌هیدروکسی پروژترون
  - ۳) رها ساز گنادوتروپین ( $G_nRH$ ) و تستوسترون (T)
  - ۴) استرادیول (E<sub>2</sub>) و پرگننولون
- ۵۶- مهم‌ترین هورمون تأثیرگذار در تنظیم اسمزی ماهیان در زمان مهاجرت به دریا و آب شیرین به ترتیب کدام موارد هستند؟
- ۱) تیروئیدی - پرولاکتین
  - ۲) پرولاکتین - تیروئیدی
  - ۳) کورتیزول - پرولاکتین
  - ۴) تیروئیدی - کورتیزول
- ۵۷- اولین لایه فولیکولی که در طی رشد تخمک در ماهیان تلئوست تشکیل می‌شود، کدام است؟
- ۱) زونا رادیاتای خارجی
  - ۲) زونا رادیاتای داخلی
  - ۳) گرانولوزا
- ۵۸- کدام مورد، عامل اصلی شروع اسپرماتوزنز در ماهیان است؟
- ۱) GtH
  - ۲) KT
  - ۳) تستوسترون
  - ۴) فعالیت پروتئین اکتیوین B
- ۵۹- جهت ایجاد مولдин تجاری (**Line**), کدام روش انتقال ژن مؤثر است؟
- ۱) انتقال بهوسیله جریان الکتریسیته
  - ۲) انتقال به روش ریز تزریق
  - ۳) انتقال به همراه اسپرم
- ۶۰- کدام گزینه، علت بروز تنوع ژنتیکی بین موجودات مختلف نمی‌باشد؟
- ۱) اپیستازی
  - ۲) اصل تفرق ژن‌ها
  - ۳) کراسینگ اور
- ۶۱- مناسب‌ترین روش برای ایجاد عقیمی در ماهی‌ها کدام است؟
- ۱) هیبریدگیری
  - ۲) استفاده از اشعه
  - ۳) استفاده از هورمون
  - ۴) تریپلوتیدی

- ۶۲- محققی بنا دارد که در یک بررسی تحقیقاتی، نوع پروتئین‌های موجود در یک نمونه حاصل از عصاره‌گیری عضلات ماهی را مشخص نماید. کدام تکنیک برای این کار مناسب است؟
- |                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
| Southern blot (۲) | Micro satellite blot (۱) |
| Northern blot (۴) | Western blot (۳)         |
- ۶۳- طی کدام فرایند از نسخه‌برداری RNA نابالغ (hnRNA) به mRNA تبدیل می‌شود؟
- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| Translation (۲)    | RNA interference (۱) |
| Exon shuffling (۴) | Splicing (۳)         |
- ۶۴- در کدام بخش از کروموزوم قرار داشته و چه وظیفه‌ای دارد؟
- |  |  |
|--|--|
| (۱) یوکروماتین، تولید RNA ناقل (T-RNA) | (۲) هتروکروماتین، تولید RNA ناقل (T-RNA) |
| (۳) یوکروماتین، تولید RNA ریبوزومی     | (۴) هتروکروماتین، تولید RNA ریبوزومی     |
- ۶۵- در کدام مورد از روابط بین آلل‌ها تنها دو نوع فنوتیپ ایجاد می‌شود؟
- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| (۱) همکاری غیراپیستاتیک ژن‌ها | (۲) غالیت کامل         |
| (۳) غالیت ژنی افزایشی         | (۴) فعالیت ژنی افزایشی |
- ۶۶- پدیده رشد جبرانی چگونه به بهبود راندمان تولید بعد از طی یک دوره گرسنگی کمک می‌کند؟
- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| (۱) تلفات کمتر انرژی     | (۲) استفاده بهینه از ذخایر انرژی بدن |
| (۳) افزایش کار این تغذیه | (۴) افزایش سختی                      |
- ۶۷- کدام گزینه در بروز بیماری لکه سفید می‌گو دخالت دارد؟
- |               |                    |
|---------------|--------------------|
| (۱) کاهش دما  | (۲) افزایش قلیائیت |
| (۳) کاهش سختی | (۴) افزایش شوری    |
- ۶۸- در مطالعات جایگزینی منابع پروتئینی گیاهی به جای آردماส در جیره غذایی آبزیان، جیره‌های آزمایشی باید چگونه باشند؟
- |                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| (۱) ایزولیپیدیک                | (۲) ایزونیتروژنوس |
| (۳) ایزونیتروژنوس و ایزوانرژیک | (۴) ایزولیپیدیک   |
- ۶۹- در صورت کمبود اسید آمینه سیستئین در جیره، کدام اسید آمینه کمبود آن را جبران می‌کند؟
- |             |                 |
|-------------|-----------------|
| (۱) متیونین | (۲) فنیل آلانین |
| (۳) والین   | (۴) هیستیدین    |
- ۷۰- چرا در تنظیم جیره‌های غذایی توجه به تعادل انرژی و سایر نوترینت‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است؟
- |  |  |
|--|--|
| (۱) تأمین نوترینت‌ها به مقدار کافی منجر به تأمین انرژی خواهد شد. | (۲) مقدار غذای دریافتی متناسب با حجم انرژی جیره خواهد بود. |
| (۳) انرژی نقش اساسی در انجام فرایندهای زیستی دارد.               | (۴) با تأمین انرژی کافی رشد به نحو مطالب انجام خواهد شد.   |
- ۷۱- با کاهش قابلیت هضم منابع تأمین انرژی در جیره، کدام مورد کاهش می‌یابد؟
- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| (۱) ضریب ذخیره پروتئین | (۲) تجزیه پروتئین        |
| (۳) مصرف پروتئین       | (۴) ضریب تحریک آنابولیکی |
- ۷۲- افزایش کربوهیدرات در جیره‌های اکستروف شده ماهی‌ها، باعث کدام مورد می‌شود؟
- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| (۱) تجمع گلیکوزن در کبد | (۲) افزایش بیماری‌های عفونی |
| (۳) حفظ پروتئین         | (۴) کاتابولیسم بهتر پروتئین |

- ۷۳ - **Sparing action** بین کدام اسیدهای آمینه دیده می‌شود؟

- (۱) فنیل آلانین و تریپتوفان
- (۲) متیونین و سیستین
- (۳) لیزین و آرژین
- (۴) لوسین و ایزولوسین

- ۷۴ - کدام عبارت در مورد انگل لرنه آ صحیح است؟

- (۱) نر و ماده نابالغ انگل هستند.
- (۲) نر و ماده بالغ انگل هستند.
- (۳) فقط نر بالغ انگل است.
- (۴) فقط ماده بالغ انگل است.

- ۷۵ - علت بیماری **Loose Shell Diseases** در میگو کدام است؟

- (۱) تغییر سولفید و کربنات
- (۲) افزایش آمونیاک و نیترات
- (۳) کاهش سختی و شوری
- (۴) تغییر pH و املاح

- ۷۶ - اختلال انعقاد زرده در تخم و لارو ماهیان می‌تواند ناشی از کدام عامل باشد؟

- (۱) فلزات سنگین در آب
- (۲) مواد معلق در آب
- (۳) افزایش املاح محلول آب
- (۴) کاهش سختی آب

- ۷۷ - افزایش تجمع مواد آلی در کف قفسه‌های پرورشی، موجب چه پدیده‌ای می‌شود؟

- (۱) تجمع پلانکتونی
- (۲) افزایش نوترینتها
- (۳) افزایش قلیائیت
- (۴) تجمع سولفید هیدروژن

- ۷۸ - کدام گزینه می‌تواند عامل انتقال آئروموناس سالمونیسیدا بین ماهیان باشد؟

- |            |             |             |              |
|------------|-------------|-------------|--------------|
| Lernea (۴) | Leeches (۳) | Argulus (۲) | Sea lice (۱) |
|------------|-------------|-------------|--------------|

- ۷۹ - مطمئن‌ترین روش شناسایی عامل بیماری‌زا در ماهیان حامل، کدام نوع تشخیص است؟

- |               |         |            |               |
|---------------|---------|------------|---------------|
| ۱) میکروسکوپی | ۲) سرمی | ۳) مولکولی | ۴) بیوشیمیایی |
|---------------|---------|------------|---------------|

- ۸۰ - عامل زخم‌های سطحی و موضعی خارجی در ماهیان کدام است؟

- |            |              |           |            |
|------------|--------------|-----------|------------|
| ۱) ریکتزیا | ۲) سایتوفاگا | ۳) ویبریو | ۴) یرسینیا |
|------------|--------------|-----------|------------|





