


کد کنترل



480


F

آزمون (نیمه‌تمركز) ورود به دوره‌های دکتری – سال ۱۴۰۲

دفترچه شماره (۱)

صبح پنج شنبه

۱۴۰۱/۱۲/۱۱



جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان استخراج امکانات کشور

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)»

ژئوفیزیک – زلزله‌شناسی (کد ۲۲۴۱)

زمان پاسخ‌گویی: ۱۳۵ دقیقه

تعداد سوال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	نا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: – فیزیک پایه ۱ و ۲ – زمین‌شناسی فیزیکی (عمومی) – فیلترهای دیجیتال – لرزه زمین‌ساخت – نکوری انتشار امواج کشسان	۴۵	۱	۴۵

این آزمون نمرة منفي دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق جلبه، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) پس از برگزاری آزمون، برای نفعی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با عجز این سازمان مجاز نیست و با مختلفین برابر مقرورات رفتار نمایند.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینچنان با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی جلد دفترچه سؤالات و پایین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

مجموعه دروس تخصصی (فیزیک پایه ۱ و ۲ - زمین‌شناسی فیزیکی (عمومی) - فیلترهای دیجیتال - لرزه زمین‌ساخت - تئوری انتشار امواج کشسان):

۱- دردهای دوربک مسیر مستقیم با شتاب متغیر در زمان $a(t) = a_0 \left(1 - \frac{t^2}{4}\right)$ در حرکت است. شتاب متوسط ذره از لحظه $t = 0$ تا $t = 2s$ کدام است؟ (۰ ضربی ثابت و t بر حسب ثانیه است).

$$\frac{1}{2}a_0 \quad (1)$$

$$\frac{2}{3}a_0 \quad (2)$$

$$\frac{1}{4}a_0 \quad (3)$$

$$\frac{1}{3}a_0 \quad (4)$$

۲- اگر فاصله زمین تا خورشید $m = \frac{1}{5} \times 10^{11}$ باشد، سرعت خطی زمین به دور خورشید تقریباً چند است؟

$$1 \times 10^7 \quad (1)$$

$$2 \times 10^9 \quad (2)$$

$$3 \times 10^4 \quad (3)$$

$$5 \times 10^3 \quad (4)$$

۳- جسمی به جرم 200 g به انتهای یک فنر سبک به طول آزاد 30 cm و ثابت فنر $\frac{N}{m} = 9$ متصل است. انتهای دیگر

فنر در دست شخصی است که این مجموعه را با سرعت زاویه‌ای $\frac{\text{rad}}{\text{s}}$ در یک صفحه افقی می‌چرخاند. شاعع

دوران جسم، چند cm است؟

$$37/5 \quad (1)$$

$$43/3 \quad (2)$$

$$51/7 \quad (3)$$

$$64/7 \quad (4)$$

- ۴- ضریب فشردگی آب $\frac{m}{N} \times 10^{-10}$ است. اگر مقدار 200cm^3 آب، تحت فشار 30MPa قرار گیرد.

چند cm^3 از حجم آن کاهش می‌یابد؟

(۱) $7/5 \times 10^{-3}$

(۲) $7/5$

(۳) $3/0 \times 10^{-3}$

(۴) $3/0$

- ۵- قطاری بر روی مسیر مستقیم افقی با شتاب $\frac{g}{5}$ در حرکت است. ظرف مایع روی میز رستوران این قطار قرار دارد.

زاویه‌ای که سطح آزاد این مایع با سطح افق می‌سازد، کدام است؟

$\cot g^{-1} \left(\frac{1}{5} \right)$ (۱)

$\tan^{-1} \left(\frac{1}{5} \right)$ (۲)

$\sin^{-1} \left(\frac{1}{5} \right)$ (۳)

(۴) صفر

- ۶- درون ظرفی یک مایع با چگالی $\frac{g}{cm^3} \times 11/4$ روی مایع دیگری با چگالی $\frac{g}{cm^3} \times 11/4$ قرار دارد. مکعبی به ضلع

۱۰cm از جنس آهن در حالت تعادل و عمودی در مرز مشترک دو مایع جای دارد. چه ارتفاعی از مکعب برحسب

سانتی‌متر درون مایع با چگالی کمتر قرار دارد؟ (چگالی آهن $\frac{g}{cm^3} \times 7/8$ است.)

(۱) $1/8$

(۲) $2/4$

(۳) $4/5$

(۴) $5/5$

- ۷- یک فواره آب را تا ارتفاع ۱۰m به بالا پرتاب می‌کند. اگر سطح مقطع دهانه خروجی فواره 8cm^2 باشد، در

یک دقیقه چند لیتر آب از فواره خارج می‌شود؟ ($g = 9/8 \frac{m}{s^2}$)

(۱) 67200

(۲) 14000

(۳) 4800

(۴) 1120

- ۸- اگر میله استاندارد به طول یک متر و از جنس آهن باشد، بیشینه تغییرات دمایی که طول میله تا دقیقت یک در ۵۰ میلیون حفظ می‌کند، بر حسب $^{\circ}\text{C}$ کدام است؟ (ضریب انبساط طولی آهن $1.2 \times 10^{-5} ^{\circ}\text{C}^{-1}$ است.)
- (۱) $\pm 1.2 \times 10^{-2}$
 (۲) $\pm 8.3 \times 10^{-2}$
 (۳) $\pm 1.2 \times 10^{-3}$
 (۴) $\pm 8.3 \times 10^{-3}$
- ۹- گرمای ویژه یک گلوله ۱۰ گرمی برابر $\frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}}$ و دمای ذوب آن $420 ^{\circ}\text{C}$ است. کمینه تندری گلوله باید چند $\frac{\text{m}}{\text{s}}$ باشد، تا پس از برخورد به هدف، ذوب شود؟ (گرمای نهان ذوب گلوله $63 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}$ و دمای اولیه آن $20 ^{\circ}\text{C}$ است.)
- (۱) ۷۷۵
 (۲) ۶۰۰
 (۳) ۶۱۹
 (۴) ۵۶۶
- ۱۰- معادله موجی به شکل $y = 6 \sin\left[\frac{2\pi}{120}(t - \frac{x}{v})\right]$ است که در آن x و y بر حسب سانتی‌متر و t بر حسب ثانیه است. طول موج و سرعت انتشار این موج به ترتیب کدامند؟
- (۱) $120 \frac{\text{cm}}{\text{s}}, 8 \text{ cm}$
 (۲) $240 \frac{\text{cm}}{\text{s}}, 8 \text{ cm}$
 (۳) $240 \frac{\text{cm}}{\text{s}}, 240\pi \text{ cm}$
 (۴) $120 \frac{\text{cm}}{\text{s}}, 240\pi \text{ cm}$
- ۱۱- به ترتیب، ناپیوستگی گوشته - هسته داخلی - هسته خارجی کدامند؟
- (۱) گوتنبرگ - موهو (۲) گوتنبرگ - لمان (۳) لمان - موهوروبیج
- ۱۲- در کدام نوع بافت سنگ‌های دگرگون شده، کانی‌ها حالت ورقه‌ای دارند؟
- (۱) کریستالوبلاستیک (۲) نماتوبلاست (۳) لپیدوبلاست
- ۱۳- لاهار، حاصل کدام نوع حرکت ثقلی است؟
- (۱) خزش (۲) روانه خاک (۳) اسلامپ
- ۱۴- در کدام رسوبات، فشردگی نقش مهم‌تری در فرایند سنگ‌شدن دارد؟
- (۱) سیلتی (۲) ماسه‌ای (۳) رسی
- ۱۵- کدام گسل، انرژی بیشتری برای جنبش مجدد لازم دارد؟
- (۱) معکوس (۲) مورب‌لغز (۳) نرمال
- (۴) امتدادلغز (۵) شنی (۶) روانه گلی (۷) گرانوبلاست (۸) موهو - گوتنبرگ

- ۱۶- پاسخ ضربه یک سیستم LTI زمان پیوسته، برابر $h(t) = \sqrt{5} \cos(\sqrt{3}t)$ است. پاسخ این سیستم به ورودی

$$x(t) = e^{-t} u(t), t = \frac{\tan^{-1} \sqrt{3}}{\sqrt{3}}$$

$\frac{\sqrt{5}}{2}$ (۱)

$\frac{\sqrt{5}}{3}$ (۲)

$\frac{\sqrt{3}}{2}$ (۳)

$\frac{\sqrt{3}}{5}$ (۴)

- ۱۷- کدام مورد، برای سیستمی با ورودی $x(t)$ و خروجی $y(t) = x(\sin(t))$ درست است؟

۱) تغییرپذیر با زمان و غیرعلی

۲) تغییرپذیر با زمان و غیرعلی

۳) تغییرپذیر با زمان و علی

- ۱۸- سیگنال زیر در حوزه فوریه است، تبدیل آن در حوزه زمان، به چه صورت است؟

$$X(j\omega) = \frac{e^{j\pi\omega}}{(2+j\omega)^2}$$

$$(t+3)e^{-2(t+3)}u(t-3) \quad (۱)$$

$$(t+3)e^{-2(t+3)}u(t+3) \quad (۲)$$

$$2e^{-2(t+2)}u(t-2) \quad (۱)$$

$$2e^{-2(t+2)}u(t+2) \quad (۲)$$

- ۱۹- سیگنال $x(t)$ ، یک سیگنال متناوب با ضرایب سری فوریه زیر است کدام مورد، درست است؟

$$c_k = \begin{cases} 1 & k = 0 \\ -j\left(\frac{1}{2}\right)^{|k|} & k \neq 0 \end{cases}$$

۱) مشتق سیگنال $x(t)$ ، نه فرد و نه زوج است.

۲) مشتق سیگنال $x(t)$ ، فرد است.

۳) مشتق سیگنال $x(t)$ ، زوج است.

۴) مشتق دوم سیگنال $x(t)$ ، زوج است.

- ۲۰- اگر $x[n]$ و سری زمانی ورودی $h[n] = \delta[n-2] + \delta[n-4] + \delta[n-6]$ در نظر گرفته شوند، پاسخ سیستم

حاصل $y[n] = x[n]^* h[n]$ ، کدام است؟

$$x[n] = \begin{cases} \frac{n}{5} & 0 \leq n \leq 5 \\ 2 - \frac{n}{5} & 6 \leq n \leq 10 \\ 0 & \text{elsewhere} \end{cases}$$

$\frac{13}{5}$ (۱)

۲ (۲)

$\frac{14}{5}$ (۱)

$\frac{11}{5}$ (۲)

- ۲۱ - یک سیستم LTI گسسته و پایدار، با معادله تفاضلی زیر توصیف می‌شود. پاسخ این سیستم به ورودی $y[n] + y[n-1] + y[n-2] + y[n-3] = x[n-2] + x[n-3] + x[n-5]$ کدام است؟

$$\forall y[n] + y[n-1] + y[n-2] + y[n-3] = x[n-2] + x[n-3] + x[n-5]$$

$$\frac{1}{4}(-1)^n \quad (1)$$

$$-\frac{1}{4}(-1)^n \quad (2)$$

$$\frac{1}{6}(-1)^n \quad (3)$$

$$-\frac{1}{6}(-1)^n \quad (4)$$

- ۲۲ - پاسخ ضربه یک سیستم LTI علی برای $h[n]$ و تبدیل z آن $H(z)$ است. اگر

$$H(z) = \frac{1+3z^{-1}}{1+z^{-1}+14z^{-2}}$$

$$\frac{1}{7} \quad (1)$$

$$\frac{3}{7} \quad (2)$$

$$\frac{1}{5} \quad (3)$$

$$\frac{3}{5} \quad (4)$$

- ۲۳ - تبدیل z برای تابع $e^{-anT}u(n)$ کدام است؟

$$\frac{z}{1-e^{-aT}z^{-1}} \quad (1)$$

$$\frac{1}{1-e^{-aT}z^{-1}} \quad (3)$$

- ۲۴ - همه موارد درباره عملگر کانولوشن درست است، به جز:

- (۱) در حوزه فرکانس، به صورت ضرب انجام می‌شود.
- (۲) برای محاسبه پاسخ ضربه یک سیستم استفاده می‌شود.
- (۳) خاصیت توضیع پذیری دارد.
- (۴) خاصیت جابه‌جایی ندارد.

- ۲۵ - کدامیک، در مورد یک سیستم LTI، نادرست است؟

- (۱) تغییرپذیر با زمان نیستند.
- (۲) پایدار هستند.
- (۳) غیرعلی هستند.

- ۲۶ - گسل اصلی عهد حاضر زاگرس (MRF)، گسل پیشانی کوهستان زاگرس (MFF)، و گسل شمال تبریز (NTF)، به ترتیب، چه ساروکاری دارند؟

- (۱) امتدادلغز راست‌گرد، معکوس، امتدادلغز راست‌گرد
- (۲) امتدادلغز چپ‌گرد، معکوس، امتدادلغز چپ‌گرد
- (۳) امتدادلغز چپ‌گرد، امتدادلغز راست‌گرد، معکوس
- (۴) معکوس، امتدادلغز راست‌گرد، امتدادلغز چپ‌گرد

- ۲۷ - از رومرکز و سازوکار کانونی زمین‌لرزه‌ها، به ترتیب برای شناسایی کدام موردهای زیر می‌توان استفاده کرد؟

- (۱) مقدار b ، زون لرزه‌زا
- (۲) میدان تنش، زون لرزه‌زا
- (۳) مرز ورقه‌های زمین‌ساختی، مقدار b
- (۴) مرز ورقه‌های زمین‌ساختی، میدان تنش

- ۲۸ - زمین‌ساخت وارون (inverse tectonic) چیست؟
- ۱) گسلش معکوس بر روی گسل نرمال پیشین
 - ۲) گسل‌های راندگی و معکوس بزرگ زاویه
 - ۳) همزمانی گسلش معکوس و امتدادلغز
 - ۴) همزمانی گسلش نرمال و امتدادلغز
- ۲۹ - مدل تنیگاه (barrier model) و مدل سدجنبشی (asperity model)، به ترتیب کدام پدیده‌ها را توجیه می‌کنند؟
- ۱) زمین‌لرزه اصلی، پس‌لرزه‌ها
 - ۲) زمین‌لرزه اصلی، پیش‌لرزه‌ها
 - ۳) پیش‌لرزه‌ها و زمین‌لرزه اصلی، زمین‌لرزه اصلی و پس‌لرزه‌ها
 - ۴) زمین‌لرزه اصلی و پس‌لرزه‌ها، پیش‌لرزه‌ها و زمین‌لرزه اصلی
- ۳۰ - پس از یک زمین‌لرزه متوسط، مشاهده شکستگی‌های نوع R با آرایش راست‌پله در صحراء، نشانه کدام است؟
- ۱) گسلش امتدادلغز راست‌گرد
 - ۲) گسلش امتدادلغز چپ‌گرد
 - ۳) زمین‌لرزه نیمه‌زرف
 - ۴) زمین‌لرزه ژرف
- ۳۱ - در محل چپ‌گسل گامه (left stepover) موجود در زون گسلی امتدادلغز چپ‌گرد، زمین‌لرزه با کدام سازوکار کانونی مورد انتظار است؟
- ۱) نرمال
 - ۲) معکوس
 - ۳) امتدادلغز راست‌گرد
 - ۴) امتدادلغز چپ‌گرد
- ۳۲ - رفتار چسبش - لغزش (stick-slip) ویژگی کدام گسل‌ها است؟
- ۱) بی‌لرزه
 - ۲) فعال
 - ۳) زمین‌لرزه‌ای
 - ۴) غیرفعال
- ۳۳ - با توجه به هندسه و خصوصیات زمین‌ساختی زون فروزانش مکران، در نواحی ساحلی مکران خطر کدام پدیده زمین‌شناختی جدی‌تر است؟
- ۱) زمین‌لغزش
 - ۲) آتشفشاری
 - ۳) سونامی
 - ۴) زمین‌لرزه اصلی
- ۳۴ - کدامیک از مدل‌های پیش‌بینی زمین‌لرزه با نظریه برگشت کشسان (Elastic Rebound Theory) هم‌خوانی دارد؟
- ۱) مدل لغزش قابل پیش‌بینی
 - ۲) مدل زمان قابل پیش‌بینی
 - ۳) مدل زمان و لغزش قابل پیش‌بینی
 - ۴) هیچ‌کدام
- ۳۵ - بر پایه داده‌های زمین‌لرزه‌ای موجود، گسل داشت بیاض با کدام گسل‌ها برهم‌کنش (interaction) دارد؟
- ۱) آبیز و نایبند
 - ۲) آبیز و فردوس
 - ۳) فردوس و نایبند
 - ۴) نایبند و طبیعی
- ۳۶ - با فرض $1/7 = Vp / Vs$ ، نسبت پواسون، کدام است؟
- ۱) $1/12$
 - ۲) $1/23$
 - ۳) $1/34$
 - ۴) $5/39$
- ۳۷ - همه کمیت‌های زیر کمیت تانسوری هستند، به جز:
- ۱) کرنش
 - ۲) تنش
 - ۳) نفوذپذیری
 - ۴) شتاب
- ۳۸ - کدام رابطه، در مورد مدول الاستیک با مدول یانگ صحیح است؟
- $$\mu = \frac{E}{2(1-\sigma)} \quad (2)$$
- $$\mu = \frac{E}{1+2\sigma} \quad (4)$$
- $$\lambda = \frac{\sigma E}{(1+\sigma)(1-2\sigma)} \quad (1)$$
- $$\lambda = \frac{\sigma E}{(1-\sigma)(1+2\sigma)} \quad (3)$$

- ۳۹ - کدام مورد، نشان‌دهنده رابطه انتشار موج در یک محیط همسانگرد و همگن الاستیک است؟

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 2(\lambda + \mu) \nabla \Delta + \mu \nabla^2 u \quad (1)$$

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = (\lambda + 2\mu) \nabla \Delta + \mu \nabla^2 u \quad (2)$$

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = (\lambda + \mu) \nabla \Delta + \mu \nabla^2 u \quad (3)$$

$$\rho \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = (\lambda + \mu) \nabla \Delta + 2\mu \nabla^2 u \quad (4)$$

- ۴۰ - حاصل $\sigma_{yy} + \sigma_{yz} + \sigma_{xz}$ ، کدام است؟

$$2\mu(e_{yy} + e_{xz} + e_{yz}) + \lambda(e_{xx} + e_{zz}) \quad (1)$$

$$2\mu(e_{yy} + e_{yz}) + \lambda(e_{xz} + e_{xx} + e_{zz}) \quad (2)$$

$$2\mu(e_{yy} + e_{xz} + e_{yz}) + \lambda(e_{yy} + e_{xx} + e_{zz}) \quad (3)$$

$$\mu(2e_{yy} + e_{xz} + e_{yz}) + \lambda(2e_{yy} + e_{xx} + e_{zz}) \quad (4)$$

- ۴۱ - معادله انتشار موج، از ترکیب کدام قوانین فیزیکی به دست آمده است؟

- (۱) هوک و گرانش (۲) هوک و اول نیوتن (۳) اول و دوم نیوتن (۴) هوک و دوم نیوتن

- ۴۲ -

همه عبارت‌های زیر صحیح‌اند، به جزء:

(۱) امواج با فرکانس‌های بالا زودتر از امواج با فرکانس‌های پایین، انرژی خود را در زمین از دست می‌دهند.

(۲) هر چه فاکتور کیفیت محیط انتشار، مقدار کمتری داشته باشد جذب انرژی کمتر است.

(۳) فاکتور کیفیت، از خصوصیات ذاتی محیط انتشار است.

(۴) فاکتور کیفیت، وابسته به طول موج محیط انتشار است.

- ۴۳ - در رابطه $v_p^2 \nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ ، پارامتر u ، نشان‌دهنده کدام است؟

- (۱) میدان موج تراکمی (۲) پتانسیل موج تراکمی (۳) پتانسیل موج برشی (۴) میدان موج برشی

- ۴۴ - رابطه بین سرعت فاز یک موج لرزه‌ای (v_g) با سرعت گروه (v_p)، کدام است؟ (۱) عدد موج، (۲) طول موج

$$v_g = v_p - \frac{1}{\lambda} \frac{\partial v_p}{\partial k} \quad (1)$$

$$v_g = v_p + \frac{\partial v_p}{\partial k} \quad (2)$$

$$v_g = v_p - \frac{\partial v_p}{\partial k} \quad (3)$$

$$v_g = v_p + \frac{1}{\lambda} \frac{\partial v_p}{\partial k} \quad (4)$$

- ۴۵ - تعداد پارامترهای مستقل ماتریس سختی در یک محیط همسانگرد عرضی، کدام است؟

۳ (۲)

۲ (۱)

۷ (۴)

۵ (۳)