



640

C

جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

«در زمینه مسائل علمی، باید دنبال قله بود.»
مقام معظم رهبری

عصر جمعه
۱۴۰۲/۱۲/۰۴

دفترچه شماره ۳ از ۳

آزمون ورودی دوره‌های دکتری (نیمه‌تمترکز) – سال ۱۴۰۳

اگروتکنولوژی و آگرواکولوژی (کد ۲۴۳۲)

مدت زمان پاسخگویی: ۱۰۵ دقیقه

تعداد سؤال: ۲۱۰

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤال‌ها

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	آمار و طرح آزمایش‌ها	۲۰	۱	۲۰
۲	زراعت	۱۵	۲۱	۳۵
۳	کنترل و گواهی بذر	۱۸	۳۶	۵۳
۴	زراعت تكمیلی، فیزیولوژی گیاهان زراعتی تکمیلی، اکولوژی گیاهان زراعی	۳۵	۵۴	۸۸
۵	اصول تولید و فرآوری بذر، فیزیولوژی و متابولیسم بذر، اکولوژی بذر	۳۷	۸۹	۱۲۵
۶	مدیریت علفهای هرز، فیزیولوژی علف‌کش‌ها، اکو فیزیولوژی علفهای هرز	۳۵	۱۲۶	۱۶۰
۷	اکولوژی تولید گیاهان زراعی، کشاورزی اکولوژیک پایدار	۵۰	۱۶۱	۲۱۰

این آزمون، نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.
اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سوالها، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالها و پایین پاسخنامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

آمار و طرح آزمایش‌ها:

- ۱ اگر فراوانی نسبی تجمعی عدد ۱۰۰ گرم در یک مجموعه ۱۰۰۰ عددی، برابر $\frac{3}{5}$ باشد، مفهوم آن کدام است؟
 (۱) ۳ درصد اعداد، حداقل ۱۰۰ گرم وزن دارند.
 (۲) ۳۰ درصد اعداد، حداقل ۱۰۰ گرم وزن دارند.
 (۳) ۷۰ درصد اعداد، حداقل ۱۰۰ گرم وزن دارند.
 (۴) ۷ درصد اعداد، درست ۱۰۰ گرم وزن دارند.

- ۲ امید ریاضی متغیر $Z = 3X_1 + \frac{X_2}{2} - 5$ باشد، برابر کدام است؟

$$Z = 3X_1 + \frac{X_2}{2} - 5$$

(۱) $9\mu_1 + \frac{1}{2}\mu_2 - 5$	(۲) $3\mu_1 + \frac{1}{2}\mu_2$
(۳) $3\mu_1 + \frac{1}{2}\mu_2 - 5$	(۴) $9\mu_1 + \frac{1}{2}\mu_2$

- ۳ اگر در یک نمونه ۱۶ عضوی از یک جامعه، جمع کل داده‌ها برابر ۴۰ و جمع مجدور داده‌ها برابر ۵۵ باشد، واریانس آن نمونه برابر کدام است؟

$$(1) 14/06$$

$$(2) 14/125$$

$$(3) 28/125$$

- ۴ در نمونه‌گیری از دو جامعه، اطلاعات زیر در دست است، واریانس ادغام شده (S_p^2) برابر کدام است؟

$$S_1 = 8, S_2 = 12, n_1 = n_2 = 5$$

$$(1) 4$$

$$(2) 10$$

$$(3) 26$$

$$(4) 10/4$$

- ۵ اگر ارتفاع گیاهان ذرت، متغیری تصادفی و دارای توزیع نرمالی با میانگین ۱۲۰ سانتی‌متر باشد و $P(z \leq 1) = P(x \leq 120) = P(z \leq 1.33) = 0.90$ دراین صورت واریانس ارتفاع بوته‌های ذرت، برابر کدام است؟

$$(1) 200$$

$$(2) 20$$

$$(3) 400$$

$$(4) جدول Z نیاز است.$$

- ۶ در آزمون جفتی کمیت $\bar{d} / S_{\bar{d}}$ ، دارای چه توزیعی است؟

$$(1) نرمال$$

$$(2) خود$$

$$(3) t - استیودنت با ۱ - n درجه آزادی$$

- ۷ اگر تعداد داده‌های یک نمونه برابر با ۱۰، میانگین داده‌ها برابر با $1/5$ و مجموع توان دوم داده‌ها برابر با $72/5$ باشد، برآورد واریانس داده‌ها چقدر است؟

$$(1) 5/5$$

$$(2) 6/5$$

$$(3) 7/5$$

$$(4) 15$$

- ۸ میانگین و واریانس توزیع نرمال استاندارد، به ترتیب، برابر کدام است؟
- (۱) ۱ و ۱
(۲) صفر و ۱
(۳) صفر و ۱۰۰
(۴) ۱۰۰ و ۲
- ۹ مساحت زیرکشت شالیزارها، دارای واریانس ۲۰۰ است. در نمونه‌ای از ۲۰۰ شالیزار، میانگین مساحت‌ها ۲ هکتار به دست آمد. اگر $Z_0 = ۲$ فرض شود، فاصله اطمینان ۹۵ درصد برای میانگین جامعه، کدام است؟
- (۱) ۴ و صفر
(۲) ۲۲ و ۲
(۳) ۱۸ و ۱۹۶
(۴) ۱/۹۶ و ۱/۹۶
- ۱۰ ضریب رگرسیون فاصله زایش بر تولید شیر، ۵/۴۰ برآورد شده است. اگر واریانس ضریب رگرسیون برآورده شده ۲۵٪ باشد، مقدار t -student برای آزمون معنی‌دار بودن ضریب رگرسیون برآورده شده، کدام است؟
- (۱) ۰/۲
(۲) ۰/۴
(۳) ۰/۶
(۴) ۰/۸
- ۱۱ در کدام مورد، اثر دو عامل در آزمایش فاکتوریل، جمع پذیر است؟
- (۱) اثر متقابل دو عامل معنی‌دار نباشد.
(۲) اثر هر عامل، به تنهایی معنی‌دار نباشد.
(۳) اثر هر عامل، به تنهایی معنی‌دار باشد.
- ۱۲ اگر داده‌های حاصل از یک آزمایش طرح کرت‌های خردشده به صورت فاکتوریل تجزیه واریانس شود، MS_E در آزمایش فاکتوریل، برابر کدام است؟
- $$\frac{MS_{Ea} + MS_{Eb}}{2}$$
 (۱) $MS_{Ea} + MS_{Eb}$

$$\frac{2(SS_{Ea} + SS_{Eb})}{df_{Ea} + df_{Eb}}$$
 (۲) $\frac{SS_{Ea} + SS_{Eb}}{df_{Ea} + df_{Eb}}$
- ۱۳ ماده آزمایشی در آزمایش چند نوع سم حشره‌کش بر روی آفت گیاه، کدام است؟
- (۱) آفت
(۲) گیاه
(۳) زمین آزمایش
(۴) سم حشره‌کش
- ۱۴ از یک طرح کرت‌های خردشده که فاکتور اصلی آن در ۲ سطح (به صورت طرح کاملاً تصادفی در ۴ تکرار) و فاکتور فرعی آن در ۲ سطح پیاده شده بود، اطلاعات زیر به دست آمده است. میانگین مربعات اثر متقابل دو فاکتور A و B، کدام است؟
- $CF = ۲۱۰/۲۵$ و $SS = ۴۹/۷۵$ و $SS_A = ۲۰/۲۵$ و $SS_B = ۰/۲۵$ و $SS_{Ea} = ۷/۵$ کل و $\sum_j \sum_k X_{ijk}^2 = ۹۷۲$
- (۱) ۳۲/۷۵
(۲) ۳۲/۵۰
(۳) ۲۲/۵۰
(۴) ۱۲/۲۵
- ۱۵ اگر درجه آزادی انحراف از درجه ۲ در یک طرح مربع لاتین مساوی ۳ باشد، درجه آزادی خطأ کدام است؟
- (۱) ۶
(۲) ۹
(۳) ۲۰
(۴) ۲۰
- ۱۶ دو عامل A و B، هر کدام در دو سطح به صورت آزمایش فاکتوریل با طرح پایه مربع لاتین اجرا شده است، اگر $SS = ۸۳۰$ کل و جمع مقادیر تیمارها به شرح زیر باشد، MS_E کدام است؟
- | | | | |
|-----|----|----|----|
| (۱) | a | b | ab |
| ۸۰ | ۹۰ | ۴۰ | ۳۰ |
- (۱) ۱۳
(۲) ۲۵
(۳) ۳۰
(۴) ۵۰

- ۱۷ در یک آزمایش از ۳ درجه حرارت جهت نگهداری نوعی سبب در یک طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار، مجموع مربعات تیمار، رابطه خطی و خطای آزمایش به ترتیب $4/5$, $3/7$ و $4/5$ به دست آمده است، مقدار F برای رابطه درجه دوم، کدام است؟

(۱) $1/2$
(۲) $1/6$
(۳) $1/5$
(۴) $1/8$

-۱۸ جهت تقسیم کار طی مراحل اجرای یک آزمایش، استفاده از کدام طرح آماری مناسب است؟

(۱) مربع لاتین
(۲) بلوک‌های کامل تصادفی
(۳) کرت‌های کاملاً تصادفی با نمونه‌برداری

-۱۹ ۳ واریته گندم و ۵ سطح کود نیتروژن به صورت آزمایش فاکتوریل در ۳ بلوک مورد آزمایش قرار گرفته است. اگر مقدار F برای اثر متقابل کود نیتروژن در واریته گندم برابر ۸ و $SS_e = 28$ باشد، اثر متقابل چقدر است؟

(۱) 32
(۲) 4
(۳) 64
(۴) 16

-۲۰ abcd، معرف کدام یک از تیمارهای یک آزمایش 3^5 است؟

(۱) $a_1 b_1 c_1 d_1 e_1$
(۲) $a_1 b_1 c_1 d_2 e_2$
(۳) $a_1 b_1 c_1 d_2 e_1$
(۴) $a_1 b_2 c_1 d_2 e_2$

زراعت:

-۲۱ گرهای فعال تثبیت‌کننده نیتروژن در ریشه گیاهان، چه رنگی هستند؟

(۱) سبز
(۲) سیاه
(۳) صورتی
(۴) قهوه‌ای

-۲۲ کدام گیاه زراعی، جزو گیاهان وجینی قرار می‌گیرد؟

(۱) جو
(۲) سیب‌زمینی
(۳) گندم
(۴) یونجه

-۲۳ کدام نوع کود حیوانی، از میزان رطوبت بالاتری برخوردار است؟

(۱) اسبی
(۲) گاوی
(۳) گوسفندی

-۲۴ کدام گیاه علوفه‌ای، از لحاظ طول دوره زندگی، گیاه یک‌ساله به شمار می‌رود؟

(۱) اسپرس
(۲) سودانگراس
(۳) شبدر شیرین

-۲۵ کدام مورد درباره سازگاری غلات به محیط، درست است؟

(۱) چاودار روزبلند - مقاوم به سرما - حساس به ریزش
(۲) سورگوم مقاوم به گرما - حساس به خشکی - حساس به سرما
(۳) ارزن مرواریدی مخصوص مناطق گرم - مقاوم به خشکی - روزبلند
(۴) جو مقاوم به خشکی - حساس به سرما - ریشه عمیق‌تر - مقاوم به خاک اسیدی

-۲۶ امروزه کدام گروه از گیاهان، به عنوان علوفه - دارو در اجزای کشت مخلوط گیاهان علوفه‌ای استفاده می‌شوند؟

(۱) باقلاء - ماشک - سویا
(۲) جو - چاودار - یولاف
(۳) شوید - ریحان - رازیانه
(۴) گاودانه - اسپرس - یونجه

-۲۷ مهم‌ترین عوامل محدودکننده عملکرد گیاهان زراعی در مناطق خشک، کدام هستند؟

(۱) رطوبت و نور
(۲) عناصر غذایی و نور
(۳) رطوبت و مواد غذایی

- ۲۸ - کدام مورد در خصوص تناوب زراعی، درست است؟
- (۱) تناوب محصولات زراعی، از لحاظ اقتصادی مقرن به صرفه نیست.
 - (۲) تناوب در مناطق خشک و نیمه خشک، از تنوع بیشتری برخوردار است.
 - (۳) تناوب باعث خستگی زمین زراعی و تخلیه آن از عناصر غذایی در درازمدت می شود.
 - (۴) در تناوب ممکن است مواد سمی تولید شده توسط یک گیاه برای گیاه بعدی مضر باشد.

- ۲۹ - مهم ترین عناصر در کاتالیزور سنتز نیکوتین و تعدیل اثر سوء ناشی از زیادی مصرف نیتروژن در توتون به ترتیب کدام است؟

- (۲) فسفر - مولیبدن
- (۴) مولیبدن - فسفر

- ۳۰ - کدام گیاه علوفه ای با وفور آب، طول عمر کوتاه تری داشته و خطر نفخ کمتری دارد؟

- (۱) امپرس
- (۲) شبدر قرمز
- (۳) شبدر ایرانی
- (۴) یونجه

- ۳۱ - گلوله ای گردن بذر، در کدام مورد به کار می رود؟
- (۱) هنگامی که خاک بسیار قلیایی است.

- (۲) زمانی که کشت در شرایط خنکر و یا گرم انجام می شود.

- (۳) زمانی که شرایط آب و هوایی، اجراء کشت فوری را بدهد.

- (۴) زمانی که در کشت گیاه موردنظر، از گودهای شیمیایی قلیایی استفاده شود.

- ۳۲ - ماده سمی گوسپیو، در کدام قسمت های پنبه وجود ندارد؟

- (۱) الیاف - ریشه - گلبرگ
- (۲) الیاف - دمبرگ
- (۳) گلبرگ - دمبرگ
- (۴) دمبرگ - ساقه و منفذ پنبه دانه

- ۳۳ - کدام مورد در خصوص سرزنى یا Topping در توتون و پنبه، درست است؟

- (۱) در هر دو گیاه، سرزنى مانع ورود به فاز زایشی می شود.

- (۲) در هر دو گیاه، سرزنى موجب ورود به فاز زایشی می شود.

- (۳) در پنبه، موجب ورود گیاه به فاز زایشی و در توتون، مانع ورود به فاز زایشی می شود.

- (۴) در پنبه، مانع ورود گیاه به فاز زایشی و در توتون، موجب ورود به فاز زایشی می شود.

- ۳۴ - اثرات مستقیم و غیرمستقیم شوری بر رشد و نمو گیاهان، به ترتیب، از کدام طریق صورت می گیرد؟

- (۱) افزایش سمیت یونی - پراکنش ساختمان خاک

- (۲) افزایش فشار اسمزی - افزایش سمیت یونی

- (۳) کاهش فشار اسمزی - برهمنزد تغذیه گیاهان

- (۴) افزایش فعالیت میکروارگانیسم های خاک - افزایش فشار اسمزی

- ۳۵ - «نظام های فاریاب و آبیاری تکمیلی در دیمزارها» و «نظام های دامپروری چرایی، رمه گردانی، تولید چوب در منابع طبیعی و جنگل های دست کاشت»، به ترتیب، وابسته به کدام منابع هستند؟

- (۱) آب سفید - آب سیاه
- (۲) آب آبی - آب سبز
- (۳) آب سفید - آب مجازی
- (۴) آب مجازی - آب سبز

کنترل و گواهی بذر:

- ۳۶ - کدام ابزار در نمونه برداری اولیه استفاده می شود؟

- (۱) فاشق
- (۲) سینی نمونه گیری

- (۳) مقسم مکانیکی

- ۳۷- کدام آزمون پایداربودن ویژگی یک واریته جدید را در طی نسل های متوالی ارزیابی می کند؟
- VCU (۴) DUS (۳) CDT (۲)
- (۱) بلاترز (۲) آزمون **VCU** به کدام منظور انجام می شود؟
- (۱) تعیین ارزش زراعی (۲) تعیین قوه نامیه بذر
- (۳) تعیین قدرت بذر (۴) تعیین مکانیزه کدام گیاه، در کشت مجدد سال بعد، مشکلی ایجاد نمی کند؟
- (۱) چاودار (۲) ذرت (۳) کلزا (۴) کنجد
- ۳۸- استفاده از کدام نوع ترکیبات، در تعیین خلوص ژنتیکی بذرها به روش بیوشیمیایی دقت بیشتری دارد؟
- (۱) اسیدهای چرب (۲) پروتئین های ذخیره ای (۳) ترکیبات فنولیکی (۴) کربوهیدرات ها
- ۳۹- آزمون «**Heterogeneity**»، در کدام یک از مراحل گواهی بذر، مورد استفاده قرار می گیرد؟
- (۱) بازرسی مزرعه (۲) تعیین سلامت بذر (۳) تعیین رطوبت بذر (۴) نمونه برداری
- ۴۰- برای نمونه برداری از خوده بذری کیسه ای بیش از ۴۰۰ کیسه، حداقل چند نمونه اولیه باید برداشت شود؟
- (۱) ۱۰ (۲) ۲۰ (۳) ۵۰ (۴) ۸۰
- ۴۱- کدام مورد در تعیین فاصله ایزو لاسیون مزارع تولید بذر نقش ندارد؟
- (۱) سیستم خاک ورزی (۲) جهت وزش باد (۳) رفتار گل دهی گونه های گیاهی (۴) در چه حالتی بازرسی مزرعه ای برای یک مزرعه می تواند تکرار شود؟
- ۴۲- ناخالصی ها در حد حداقل استاندارد مجاز باشد.
- ۴۳- ناخالصی ها دو تا سه برابر حداقل استاندارد مجاز باشد.
- ۴۴- ناخالصی ها حداقل سه برابر حداقل استاندارد مجاز باشد.
- ۴۵- ناخالصی ها کمتر از دو برابر حداقل استاندارد مجاز باشد.
- ۴۶- بذر سوپر الیت معادل کدام یک از طبقات بذری است؟
- (۱) مادری (۲) پرورده یک (۳) پرورده دو
- ۴۷- در بازرسی مزرعه ای، الگوی حرکت پلکانی در مورد کدام محصولات انجام می شود؟
- (۱) گندم (۲) گنجد (۳) ذرت (۴) برنج
- ۴۸- کدام مورد در خصوص آزمون خلوص بذر، اشتباه است؟
- (۱) بذر های لاغر و چروکیده به عنوان بذر خالص در نظر گرفته نمی شوند.
- (۲) بذر های ریز به عنوان بذر خالص در نظر گرفته می شوند.
- (۳) بذر های بدون لما و پالاثا در خانواده گرامینه به عنوان بذر خالص در نظر گرفته می شوند.
- (۴) بذر های شکسته بزرگ تر از نصف اندازه به عنوان بذر خالص در نظر گرفته می شوند.
- ۴۹- کدام علف هرز از جمله علف های هرز غیر مجاز مزارع تولید بذر گندم محسوب می شود؟
- (۱) پنیرک (۲) خارشتر (۳) شیرین بیان (۴) یولاف وحشی

- ۵۰- کدام دسته از بذرها، ارتودوکس نیستند؟
- (۱) ذرت - نارگیل - شاهبلوط
(۲) کاکائو - سویا - سیاهدانه
(۳) مانگو - کائوچو - آووکادو
- ۵۱- درصد روغن در بذر A، B و C به ترتیب ۵۰، ۴۰ و ۳۰ درصد است، در رطوبت نسبی هوای یکسان، درصد رطوبت کدام بذر، بیشتر است؟
- (A) ۱
(B) ۲
(C) ۳
(D) هر سه مساوی هستند.
- ۵۲- در آزمون تعیین قدرت بذر سویا، نشت کدام عنصر، با کیفیت بذر همبستگی بیشتری دارد؟
- (۱) پتاسیم
(۲) سدیم
(۳) فسفر
(۴) منیزیم
- ۵۳- در مزرعه تولید بذر هیبرید ذرت، وجود کدام مورد مجاز است؟
- (۱) بوته‌های والد پدری دارای بلال
(۲) بوته‌های والد مادری در حال گردهافشانی
(۳) بوته‌های والد پدری در خطوط والد مادری

زراعت تکمیلی، فیزیولوژی گیاهان زراعتی تکمیلی، اکولوژی گیاهان زراعی:

- ۵۴- کدام عامل به جز تشعشعات خورشیدی، می‌تواند در ایجاد گرمای مورد نیاز گیاه به طور غیرمستقیم دخالت داشته باشد؟
- (۱) آلدگی صوتی
(۲) دوری و نزدیکی به شهر
(۳) ساعات روشنایی
(۴) رقم زراعی
- ۵۵- در کدام آرایش کاشت گیاهان، کمترین بهره‌عاید علف‌های هرز می‌شود؟
- (۱) لوزی
(۲) مربعی
(۳) مستطیل
(۴) شمالی - جنوبی
- ۵۶- شایع‌ترین محصولات گیاهی تراژن کدام‌اند؟
- (۱) پنبه - برنج - گندم - آفتابگردان
(۲) سویا - پنبه - ذرت - کلزا
(۳) سویا - پنبه - ذرت - کلزا
- ۵۷- منظور از گیاه پالایی، چیست؟
- (۱) رفع آلدگی خاک توسط گیاه
(۲) شناسایی آلدگی خاک توسط گیاه
(۳) پیشگیری از آلدگی خاک توسط گیاهان
(۴) مدیریت آلدگی خاک به کمک باقیمانده گیاهان پس از برداشت محصول
- ۵۸- کدام عامل، بیشترین اطلاعات را در مورد حاصلخیزی خاک ارائه می‌دهد؟
- (A) SAR (۴)
(B) ESP (۳)
(C) CEC (۲)
(D) EC (۱)
- ۵۹- در سیستم کشاورزی دقیق، فناوری نسبی متغیر (موسوم به VRT) به چه امکاناتی گفته می‌شود؟
- (۱) حسگرها
(۲) سیستم آبیاری خودکار
(۳) سیستم اطلاعات جغرافیایی
(۴) سیستم موقعیت‌یاب جهانی
- ۶۰- اگر کل تبخیر و تعرق (Evapotranspiration) گیاه بادام‌زمینی کشتشده در شرایط فاریاب برابر ۴۸۰۰ مترمکعب در هکتار باشد، با درنظر گرفتن تراکم بوته ۴ در مترمربع، وزن هزار دانه ۵۰۰ گرم و تعداد ۱۲۰ بذر در هر بوته، کارآیی مصرف آب (WUE) برای تولید بذر چند کیلوگرم به مترمربع خواهد شد؟
- (۱) ۲
(۲) ۱/۵
(۳) ۱
(۴) ۰/۵

- ۶۱- مردم باستان، برای تسکین دردهای خود از کدام گیاه دارویی استفاده می‌کردند؟
 ۱) آویشن کوهی ۲) زعفران ۳) مورد ۴) شاهدانه
- ۶۲- کدام مورد، عبارت زیر را به درستی کامل می‌کند؟
 «محدوده حرارتی مناسب گیاهان «محدوده اپتیمم» نامیده می‌شود، که در آن دامنه، گیاهان حداکثر و را انجام می‌دهند و بیشترین محصول را تولید می‌کنند.»
 ۱) جذب - تعرق ۲) رشد ریشه - ریزش برگ ۳) شاخه‌دهی - گل‌دهی ۴) فتوسنتر - تنفس
- ۶۳- کدام گیاه رنگزای طبیعی، برای این منظور کشت نمی‌شود?
 ۱) حنا ۲) روناس ۳) گلرنگ ۴) نیل
- ۶۴- در مسیر انتشار CO_2 اتمسفر به محل کربوکسیلاسیون در برگ‌ها، اجزای فاز مایع این مسیر کدام‌اند و منبع اصلی مقاومت در مسیر انتشار CO_2 به صورت فاز گازی چیست?
 ۱) سیتوسول و غشاء کلروپلاست - مقاومت مزوپیلی ۲) سیتوسول و دیواره‌های سلولی - مقاومت روزنهاي
 ۳) فضاهای بین‌سلولی و روزن - مقاومت روزنهاي ۴) فضاهای بین‌سلولی و لایه مرزی - مقاومت لایه مرزی
- ۶۵- حاصل واکنش‌های نوری فتوسنتر چیست و در کجا کاربرد دارد?
 ۱) ATP و NADPH در چرخه کالوین ۲) ADP و NADP در چرخه کربس ۳) ADP و NADP در چرخه کالوین
- ۶۶- ترکیبات نیتروژنی در گیاهان که در آثر صدمات ناشی از چرای علفخواران و تغذیه حشرات، مواد تدافعی فرار آزاد می‌کنند، کدام‌اند?
 ۱) فیتوكسین و فلاونوئید ۲) آلالوئیدها و ایزوفلافونوئید
 ۳) سیانیدریک اسید و تیوسیانات‌ها ۴) گلوکوزیدهای سیانورژنیک و گلوگوزینولات‌ها
- ۶۷- کدام‌یک از رویدادهای معرفی شده، در گیاهان CAM در طول شب انجام می‌شوند?
 ۱) بسته‌شدن روزنها و کاهش تلفات آب ۲) اسیمیله‌شدن CO_2 و کاهش تلفات آب
 ۳) مصرف‌شدن مالیک اسید تجمع‌یافته در واکوئل‌ها ۴) کربوکسیلاسیون PEP و تجمع مالیک اسید (در واکوئل‌ها)
- ۶۸- در نبود تنفس‌های محیطی، مقدار CO_2 ورودی به گیاه به‌طور عمده توسط کدام مقاومت تعیین می‌شود?
 ۱) روزنهاي ۲) لایه مرزی ۳) بافت مزوپیل ۴) غشای کلروپلاست
- ۶۹- فرم اصلی صادرات نیتروژن ثبت‌شده از ریشه بقولاتی مانند نخودفرنگی و عدس به ساقه آنها، کدام نوع از ترکیبات نیتروژنی است?
 ۱) آلانتوئین و سیتروزین ۲) آسپاراژین و گلوتامین ۳) آمیدها و یوریدها
- ۷۰- یک گیاه زراعی علوفه‌ای طی دوره ۷۵ روزه رشد خود، ۱۵ تن علوفه خشک در هکتار تولید کرده است. سرعت رشد محصول (CGR) (گرم در مترمربع در روز) این مزرعه کدام است?
 ۱) ۵ ۲) ۲۰ ۳) ۲۰۰ ۴) ۵۰
- ۷۱- کدام اظهارنظر در مورد بیوسنتر اتیلن در گیاهان، درست است?
 ۱) اکسین، تولید اتیلن را تحریک می‌کند.
 ۲) اکسین از تولید اتیلن جلوگیری می‌کند.
 ۳) تنفس خشکی و سرمآزادگی بازدارنده تولید اتیلن هستند.
 ۴) غرقابی و صدمات مکانیکی از تولید اتیلن ممانعت می‌کنند.

- ۷۲- در خاک‌های غرقاب، گیاهان حساس به شرایط آنوسی، انرژی لازم برای انجام فعالیت‌های زیستی خود را از کدام مسیر متابولیک تأمین می‌کنند؟

- (۱) تنفس میتوکندریایی
- (۲) تنفس نوری
- (۳) تخمیر اتانولی
- (۴) مسیر پنتوز فسفات

- ۷۳- پایین‌بودن شاخص برداشت در یک گیاه دانه‌ای در حالی که میزان بیوماس تولیدی بالا است، نشانه چیست؟

- (۱) بالابودن هزینه نگهداری
- (۲) بالابودن تنفس نوری

(۳) نامناسب‌بودن توزیع مواد فتوسنتری و محدودیت مخزن

(۴) ذخیره‌نمودن مواد فتوسنتری در اندام‌های رویشی و ناتوانی در انتقال مجدد مواد

- ۷۴- کدام مورد در ارتباط با تراکم مطلوب کشت گیاهان زراعی، درست است؟

(۱) تراکم مطلوب کشت برای کلزا پاییزه، بیشتر از نوع بهاره آن است.

(۲) تراکم مطلوب کشت یونجه پاییزه، کمتر از نوع بهاره آن است.

(۳) تراکم مطلوب کشت گندم پاییزه بیشتر از نوع بهاره آن است.

(۴) تراکم مطلوب کشت هر سه گیاه گندم، کلزا و یونجه به صورت پاییزه بیشتر از نوع بهاره آن است.

- ۷۵- در کدام سامانه خاک‌ورزی، برای کنترل مکانیکی علف‌های هرز، محدودیت وجود دارد؟

(۱) No-till

(۲) Minimum-till

(۳) Conventional-till

(۴) Reduced-till

- ۷۶- یک مزرعه گندم پاییزه در کل دوره رشد خود ۳۶۰۰ درجه روز رشد دریافت می‌کند (به طور متوسط ۱۵ درجه روز رشد در هر روز)، اگر سرعت رشد محصول ۷ گرم در مترمربع در روز و شاخص برداشت ۴۰ درصد باشد، عملکرد دانه آن چند کیلوگرم در هکتار است؟

(۱) ۶۷۲

(۲) ۱۶۸۰

(۳) ۶۷۲۰

- ۷۷- در یک سیستم جنگل زراعی متنوع تشکیل شده از گونه‌های گیاهی متفاوت از لحاظ نیاز نور، کارایی مصرف نور (LUE) از اشکوب بالا به پایین، چگونه تغییر می‌کند؟

(۱) ثابت است.

(۲) افزایش می‌یابد.

(۳) کاهش می‌یابد.

- ۷۸- آیش‌بندی، تناوب زراعی و کشت مخلوط، به ترتیب، چه تنوعی را در یک سیستم زراعی ایجاد می‌کنند؟

(۱) زمانی، مکانی - زمانی، مکانی

(۲) مکانی، زمانی - زمانی، مکانی

(۳) مکانی - زمانی، مکانی، زمانی

- ۷۹- در یک اگرواکوپیستم، انرژی خورشید و کود دامی، به ترتیب، در زمرة کدام نوع منبع انرژی دسته‌بندی می‌شوند؟

(۱) اکولوژیک - اکولوژیک

(۲) بیولوژیک - اکولوژیک

(۳) بیولوژیک - زراعی

- ۸۰- در ارتباط با افزایش غلظت دی‌اکسیدکربن در محیط رشد یک گیاه سه‌کرنه، کدام مورد درست است؟

(۱) میزان زیست‌توده کاهش می‌یابد.

(۲) نسبت Root Shoot کاهش می‌یابد.

(۳) کارایی مصرف آب کاهش می‌یابد.

(۴) کارایی مصرف نیتروژن فتوسنتری افزایش می‌یابد.

-۸۱- عملکرد دانه در شبدر برسیم، تابعی از کدام اجزاء عملکرد است؟

- ۱) تعداد بوته در واحد سطح، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه
- ۲) وزن غلاف، وزن دانه در غلاف، تعداد دانه در بوته و تعداد بوته در مترمربع
- ۳) تعداد بوته در واحد سطح، اندازه غلاف، تعداد دانه در غلاف و وزن هر غلاف
- ۴) تعداد بوته در واحد سطح، تعداد غلاف در بوته، وزن غلاف و هزار دانه

-۸۲- چنانچه در مرحله گلدهی و پرشدن دانه، تنفس گرما در غلات سردسیری، حادث شود، کدام صفت کمتر تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟

- ۱) تعداد دانه
- ۲) تعداد گلچه
- ۳) تعداد سنبلچه
- ۴) وزن هزاردانه

-۸۳- در کدام روش کشت مخلوط، هدف اصلی، کنترل فرسایش و مدیریت علفهای هرز است؟

- ۱) کشت مخلوط نواری
- ۲) کشت مخلوط ردیفی
- ۳) کشت مخلوط به روش افزایشی
- ۴) کشت مخلوط به روش جایگزینی

-۸۴- کدام مورد، عبارت زیر را به درستی کامل می‌کند؟

«کوچک تر شدن مقیاس سطح ویژه برگ (SLA) موجب برگ‌ها و می‌شود.»

- ۱) ضخیم‌تر شدن، کاهش توان فتوسنتری
- ۲) نازک‌تر شدن، افزایش توان فتوسنتری
- ۳) نازک‌تر شدن، کاهش توان فتوسنتری
- ۴) نازک‌تر شدن، افزایش توان فتوسنتری

-۸۵- در بین عوامل مؤثر در ایجاد رقابت برون‌گونهای گیاهان، کدام عامل تأثیر کمتری دارد؟

- ۱) طول عمر گیاهان
- ۲) تفاوت ارتفاع، سطح برگ و سرعت رشد
- ۳) مجاورت و قرارگیری گیاهان در کنار یکدیگر
- ۴) همپوشانی آشیان‌های اکولوژیک و محدودیت منابع مشترک

-۸۶- در بین شاخص‌های رشد، کدام مورد نشان‌دهنده کارایی فتوسنتری در گانوبی گیاه زراعی است؟

- ۱) NAR
- ۲) RGR
- ۳) LAR
- ۴) CGR

-۸۷- کدام مورد در مقایسه بین سیستم‌های کشاورزی سنتی (Traditional agriculture) و متداول صنعتی (Conventional agriculture)، درست است؟

- ۱) در کشاورزی سنتی، عملکرد پتانسیل بالا و کارایی استفاده از نهاده‌ها پایین است.
- ۲) در کشاورزی سنتی، عملکرد پتانسیل پایین و عملکرد واقعی باثبات‌تر است.
- ۳) در کشاورزی متداول، عملکرد پتانسیل بالا و عملکرد واقعی باثبات‌تر است.
- ۴) در کشاورزی متداول، ثبات و پایداری عملکرد بالاتر است.

-۸۸- در شرایط دمایی ۱۵ تا ۲۰ درجه سلسیوس، کدام مورد در ارتباط با عملکرد کوانتمومی گیاهان، درست است؟

- ۱) سورگوم از گندم و جو بیشتر است.
- ۲) سورگوم از برنج و ذرت بیشتر است.
- ۳) گندم و جو از ذرت و سورگوم بیشتر است.
- ۴) ذرت از سورگوم، گندم و برنج بیشتر است.

اصول تولید و فراوری بذر، فیزیولوژی و متابولیسم بذر، اکولوژی بذر:

-۸۹- پرایمینگ بذر، تا انتهای کدام مرحله جذب آب توسط بذر انجام می‌شود؟

- ۱) ۲
- ۲) ۳
- ۳) ۴

- ۹۰- کدام مورد، به عنوان مواد چسباننده در فرایند پلت کردن بذرها، استفاده می شود؟
- (۱) پکتین (۲) پلیمر ونیل (۳) سلولز (۴) گل رس
- ۹۱- برداشت ماشینی مزارع تولید بذر هیبرید ذرت (در کشورهای پیشرفته)، با کمتر از چه میزان رطوبت بذر توصیه می شود؟
- (۱) ۱۵ (۲) ۲۰ (۳) ۲۵ (۴) ۳۰
- ۹۲- انجام ورنالیزاسیون جهت تحریک گل دهی در تولید بذر چغندر قند به ترتیب در کدام درجه حرارت و طول روز انجام می شود؟
- (۱) بالا - بلند (۲) بالا - کوتاه (۳) پائین - کوتاه (۴) پائین - بلند
- ۹۳- در "Drum Priming" مقدار آب اضافه شده به بذر، علاوه بر وزن بذر مورد استفاده، به میزان رطوبت بذر در کدام مرحله آب گیری بذر وابسته است؟
- (۱) ابتدای مرحله دوم (۲) اواسط مرحله اول (۳) پایان مرحله دوم (۴) اواسط مرحله دوم
- ۹۴- در پروسه پرایمینگ بذر، کدام مورد اتفاق نمی افتد؟
- (۱) فعالیت های آنزیمی (۲) تقسیم سلولی و خروج ریشه چه (۳) ترمیم اندام های سلولی
- ۹۵- فرایند خشک کردن بذرها، تابع کدام عامل نیست؟
- (۱) دمای خشک کردن (۲) میزان بذر (۳) زمان خشک کردن
- ۹۶- هیدرو و دروم پرایمینگ در کدام مورد با هم متفاوتند؟
- (۱) دمای پرایمینگ (۲) طول مدت پرایمینگ (۳) مقدار آب در بستر بذر در دوره پرایمینگ
- ۹۷- در برداشت گیاهان مستقر در مزرعه تولید بذر یونجه، کدام وسیله استفاده می شود؟
- (۱) چاپر (۲) کمباین (۳) پیگر هاسگر (۴) دروغرهای تیغه ای
- ۹۸- کدام مورد در خصوص اسموپرایمینگ با NaCl و پلی اتیلن گلایکول، درست است؟
- (۱) در پرایمینگ با پلی اتیلن گلایکول در مواردی کمبود اکسیژن محلول پرایم عامل محدود کننده است. (۲) پتانسیل آب محلول پرایم در پرایمینگ با NaCl بهتر از پلی اتیلن گلایکول حفظ می شود. (۳) جذب آب توسط سلول های جنینی در محلول NaCl کمتر از پلی اتیلن گلایکول است. (۴) سمیت یون در محلول پرایم پلی اتیلن گلایکول بیشتر از محلول پرایم با NaCl است.
- ۹۹- در مسیر سیگنانینگ جیبرلین، با غیرفعال شدن کدام پروتئین، جوانه زنی بذر فعال می شود؟
- | | |
|--------------------|-------------------|
| LEA protein (۲) | DOG protein (۱) |
| GA-MYB protein (۴) | DELLA protein (۳) |
- ۱۰۰- کدام مورد، کربوهیدرات ذخیره ای بذر محسوب نمی شود؟
- (۱) پکتین (۲) رافینوز (۳) نشاسته (۴) همی سلولز
- ۱۰۱- در تولید بذر ذرت شیرین، تغییر فعالیت کدام آنزیم، نقش کلیدی دارد؟
- | | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Galactosyltransferase (۲) | Invertase (۱) |
| Starch branching enzyme (۴) | ADP-Glc Pyrophosphorylase (۳) |
- ۱۰۲- در فرایند پرشدن بذر، افزایش غلظت کدام هورمون، سبب کاهش سرعت پرشدن بذر می شود؟
- (۱) اکسین (۲) اتیلن (۳) آبسیزیک اسید (۴) براسینو استروئید

- ۱۰۳ - عامل اصلی در القای خفتگی اولیه بذر، کدام است؟**
- (۱) اکسین، محور جنینی
 - (۲) کربوهیدرات، محور جنینی
 - (۳) آبسیزیک اسید، محور جنینی
 - (۴) آبسیزیک اسید، گیاه مادری
- ۱۰۴ - کدام مورد در خصوص فرایند جایگزینی آب، هنگام خشک شدن بذرها روی گیاه مادری، درست است؟**
- (۱) کاهش مقدار رافینوز تجمع یافته در بذرها
 - (۲) کاهش مقدار گلایسین بتائین در سلول‌ها
 - (۳) افزایش مقدار آمینواسید آرژنین برای پایدارشدن بیشتر غشاء
 - (۴) افزایش تجمع قندهای احیاکننده مانند سوکرز و تری‌هالوز درون سلول‌ها
- ۱۰۵ - حذف فیتوکروم A، سبب کدام مورد می‌شود؟**
- (۱) ایجاد پاسخ به جوانهزنی در شدت نوری، خیلی کم
 - (۲) ایجاد پاسخ به جوانهزنی در شدت نوری، خیلی شدید
 - (۳) حذف پاسخ به جوانهزنی در شدت نوری، خیلی کم
 - (۴) حذف پاسخ به جوانهزنی در شدت نوری، کم
- ۱۰۶ - نقش اصلی در قطبیت و الگوبندی جنین نهان‌دانگان، بر عهده کدام هورمون است؟**
- (۱) اکسین
 - (۲) اتیلن
 - (۳) جیربرلین
 - (۴) براسینواستروئید
- ۱۰۷ - در فرایند ساخت نشاسته در بذر، کدام مورد رخ می‌دهد؟**
- (۱) آنزیم فسفوگلوکومیوتاز نقشی ندارد.
 - (۲) فروکتوز با آنزیم هگزوزفسفات‌لیزومراز به فروکتوز - ۶-فسفات تبدیل می‌شود.
 - (۳) در غلات، تبدیل گلوکز - ۱-فسفات به ADPGlc صرفاً در آمیلوبلاست سلول‌های ذخیره‌ای انجام می‌شود.
 - (۴) ساکارز در آغاز در سیتوپلاسم سلول‌های سازنده نشاسته به فروکتوز و بوریدین دی‌فسفوگلوکز تبدیل می‌شود.
- ۱۰۸ - در جوانهزنی بذر گوجه‌فرنگی، شکافتگی پوسته بذر و شکافتگی آندوسپرم، به ترتیب، توسط کدام مورد کنترل می‌شود؟**
- (۱) فقط جیربرلین
 - (۲) جیربرلین و اتیلن
 - (۳) جیربرلین و اکسین
 - (۴) سیتوکینین و جیربرلین
- ۱۰۹ - در گیاه تحت تنفس خشکی ذرت، مرگ جنین بذر عمدهاً در اثر گمبود کدام مورد رخ می‌دهد؟**
- (۱) آب
 - (۲) ساکارز
 - (۳) نمک‌های غذایی
 - (۴) هورمون آبسیزیک اسید
- ۱۱۰ - در آندوسپرم بذر برنج، کدام پروتئین و از چه مسیر سنتزی ذخیره می‌شود؟**
- (۱) پروتئین پرولامین از مسیر واکوئلی
 - (۲) پروتئین گلوتنین از مسیر شبکه آندوبلاسمی
 - (۳) پروتئین پرولامین و گلوتنین از مسیر شبکه آندوبلاسمی و مسیر واکوئلی
 - (۴) پروتئین گلوتنین و پرولامین به ترتیب از مسیر واکوئلی و مسیر شبکه آندوبلاسمی
- ۱۱۱ - کدام مورد در خصوص زن «Gpc - B1 - Zn» گندم، درست است؟**
- (۱) این زن در ارقام زراعی جدید، فعال و در نیاکان گندم، غیرفعال است.
 - (۲) وجود آلل فعال آن، با افزایش عملکرد دانه و افزایش دوام سیزمانی برگ‌ها، رابطه مستقیم دارد.
 - (۳) وجود آلل فعال آن در یک رقم، مقدار پروتئین، روی و آهن دانه را به هزینه کاهش عملکرد دانه، افزایش می‌دهد.
 - (۴) وجود آلل فعال آن در گندم، باعث تسریع پیری برگ و افزایش انتقال مجدد مواد غذایی برگ‌ها به دانه‌های در حال رشد می‌شود.
- ۱۱۲ - عکس‌العمل جوانهزنی به نیترات در برخی گیاهان، به کدام عوامل محیطی دیگری بستگی دارد؟**
- (۱) درجه حرارت ثابت
 - (۲) درجه حرارت متناوب
 - (۳) نور و درجه حرارت متناوب و نور

- ۱۱۳- بهبود جوانهزنی با دود، ناشی از کدام ترکیبات است؟
- (۱) اسیدهای چرب (۲) سولفات منیزیم (۳) نیتروژن دی اکساید (۴) کلرید پتابسیم
- ۱۱۴- در بانک‌های بذری خاک براساس طول عمر بذر، «Short Term Persistence» به کدام مدت برای وجود و اثشان در خاک اشاره دارد؟
- (۱) حداقل کمتر از یک سال (۲) حداقل کمتر از پنج سال (۳) حداقل کمتر از یک سال و حداقل ۲ سال (۴) حداقل یک سال و حداقل کمتر از پنج سال
- ۱۱۵- کدام عوامل محیطی در شکست خواب (After-ripening)، نقش بیشتری دارند؟
- (۱) دمای نسبتاً بالا و رطوبت کم (۲) دمای پایین و رطوبت بالا (۳) دمای پایین و رطوبت کم (۴) دمای نسبتاً بالا و رطوبت بالا
- ۱۱۶- کدام عامل از لحاظ اکولوژیکی، در بازدارندگی جوانهزنی در عمق‌های پایین در خاک، نقش دارد؟
- (۱) اندازه بذر (۲) دما (۳) رطوبت (۴) نوع خاک
- ۱۱۷- کدام مورد، در تقاضای خواب ثانویه بذر نقش دارد؟
- (۱) اندازه بذر (۲) شرایط بی‌هوایی (۳) عمق کاشت بذر (۴) میزان رطوبت بذر
- ۱۱۸- خواب القا شده به بذر بر روی پایه‌هادری، به کدامیک از انواع خواب بذر گفته می‌شود؟
- Secondary Innate Induced Enforced
- ۱۱۹- کمبود منگنز در گیاه «Avena sativa»، به ترتیب، چه اثری بر درصد بذور زایا و درصد خواب بذور زایا در بذر تولیدی گیاه دارد؟
- (۱) هردو کاهش (۲) هر دو افزایش (۳) کاهش - افزایش (۴) افزایش - کاهش
- ۱۲۰- معمولاً رقابت گیاهی، چه تأثیری بر وضعیت بذور تولیدی دارد؟
- (۱) خواب بذر را افزایش می‌دهد. (۲) خواب بذر را کاهش می‌دهد. (۳) بر خواب بذر بی‌تأثیر است. (۴) قوه‌نامه‌به بذور تولیدی را افزایش می‌دهد.
- ۱۲۱- کدام مورد درباره اثر بازدارندگی مواد مختلف بر جوانهزنی بذر، درست است؟
- (۱) اثر بازدارندگی سدیم، بیشتر از پتابسیم است. (۲) اثر بازدارندگی یون کلر، بیشتر از یون SO_4^{2-} است. (۳) اثر بازدارندگی یون SO_4^{2-} ، بیشتر از یون کلر است.
- ۱۲۲- کاهش پتانسیل آب محیط جوانهزنی در برخی گونه‌های گیاهی، سبب کدام مورد می‌شود؟
- (۱) خواب ثانویه را الگا می‌کند. (۲) تأثیری بر سایر نیازهای جوانهزنی ندارد. (۳) نیاز نوری جوانهزنی را تغییر می‌دهد.
- ۱۲۳- در مناطق خشک و نیمه‌خشک در مقدار یکسان بارندگی در عرصه‌های سنگی و خاکی، میزان جوانهزنی و استقرار گیاهچه در عرصه‌های سنگی بیشتر از عرصه‌های خاکی است. علت این وضعیت، کدام است؟
- (۱) تهویه بهتر در بستر بذرها در عرصه‌های سنگی (۲) دریافت نور بیشتر توسط بذرها در عرصه‌های سنگی (۳) توزیع بهتر و بیشتر آب در بستر بذرها موجود در فواصل سنگها (۴) بهتر شدن شرایط دمایی برای جوانهزنی بذرها در عرصه‌های سنگی
- ۱۲۴- کدام پارامتر نوری، در زمان رسیدگی بر روی پایه مادری بر وضعیت خواب بذرها تولیدی، تأثیر کمتری دارد؟
- (۱) کیفیت نور (۲) شدت تابش (۳) پیوستگی کامل تابش نور (۴) اثر فتوپریودیک نور

۱۲۵- وجود مواد موسیلایزی در پوشش اطراف بذر در اکوسیستم‌های خشک و نیمه خشک، در کدام مورد، محدودیت برای جوانهزنی ایجاد می‌کند؟

- ۲) اکسیژن ناکافی برای جنین
- ۴) مشکلات رطوبتی برای جوانهزنی
- ۱) سختی پوسته بذر
- ۳) ایجاد فشار مکانیکی بر جنین

مدیریت علف‌های هرز، فیزیولوژی علف‌ها، اکو فیزیولوژی علف‌های هرز:

۱۲۶- کدام علف‌کش در سیستم بستر کهنه (خفته)، قبل از کاشت محصول اصلی کاربرد دارد؟

- ۱) اکسیفلورفن
- ۲) پاراکوات
- ۳) توفور دی
- ۴) گلوفوسینت

۱۲۷- کدام گیاه به عنوان میزبان سسن شناخته می‌شود؟

- ۱) توپق
- ۲) ذرت
- ۳) جو وحشی
- ۴) بولاف وحشی

۱۲۸- احتمال تخلیه کامل بانک بذر علف‌های هرز با کاربرد کدام ترکیب امکان‌پذیر است؟

- ۱) واپام
- ۲) متربوزین
- ۳) گلیفوسیت
- ۴) تریفلورالین

۱۲۹- مدیریت کدام علف هرز از طریق کاربرد علف‌کش‌ها با مشکلات بیشتری همراه است؟

- ۱) تاج خروس
- ۲) تاتاوره
- ۳) خرفه
- ۴) کاتوس

۱۳۰- براساس استانداردهای تعیین شده توسط مدرسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشور (SPCRI)، حداقل تعداد بذر علف‌های هرز در یک کیلو بذر گواهی شده گندم، چقدر است؟

- ۱) صفر
- ۲) ۸
- ۳) ۲
- ۴) ۱۶

۱۳۱- جمعیت و تنوع کدام گروه از علف‌های هرز پس از آجرایی طولانی مدت سیستم شخم کاهش یافته، افزایش خواهد یافت؟

- ۱) پهن برگ‌ها
- ۲) چندساله‌ها
- ۳) نازک برگ‌ها
- ۴) یکساله‌ها

۱۳۲- کدام روش برای کنترل بهتر علف هرز لئی (Typha spp.) توصیه می‌شود؟

- ۱) Chaining
- ۲) Dredging
- ۳) Draining
- ۴) Flooding

۱۳۳- کدام گیاه زراعی تله (Trap Crop) جهت تحریک جوانهزنی بذر علف جادو (Striga sp.) مناسب است؟

- ۱) ارزن
- ۲) پنبه
- ۳) سورگوم
- ۴) یونجه

۱۳۴- در روش کنترل بیولوژیک به شیوه افزایشی (Augmentative)، بیشتر از کدام عامل کنترلی استفاده می‌شود؟

- ۱) انگل‌ها
- ۲) بندپایان
- ۳) مهره‌داران کوچک
- ۴) عوامل بیماری‌زای گیاهی و نماتدها

۱۳۵- در بین محصولات زراعی، کدام محصول بیشترین سطح زیر کشت گیاهان تراویخته مقاوم به علف‌کش را به خود اختصاص داده است؟

- ۱) پنبه
- ۲) ذرت
- ۳) سویا
- ۴) کلزا

۱۳۶- در حال حاضر، چند محل عمل (Site of action) شناخته شده علف‌کش وجود دارد؟

- ۱) ۱۱
- ۲) ۲۱
- ۳) ۳۱
- ۴) ۴۱

۱۳۷- ناسازگاری فرمولاسیونی (لخته شدن و تهشیں ماده مؤثر) از کاربرد مخلوط کدام علف‌کش دیده می‌شود؟

- ۱) تریازین - آلاکلر
- ۲) گلیفوسیت - توفوردی

- ۳) تریفلورالین - سیمازین
- ۴) توپوردی - دایکلوفوپ

- ۱۳۸- استفاده از تریفلورالین چه عارضه‌هایی روی گیاهان حساس ایجاد می‌کند؟
 ۱) پیچ خوردگی برگ‌ها
 ۲) کوتاه و قطورشدن ساقه
 ۳) متورم شدن ساقه
 ۴) کوتاه و قطورشدن ریشه و عدم رشد ریشه‌های جانبی
- ۱۳۹- در اثر اختلاط توفور دی با کلودینافوب، کدام حالت اتفاق می‌افتد؟
 ۱) آنتاگونیسم
 ۲) افزایشی (Additive)
 ۳) سینرژیسم
- ۱۴۰- رسک بروز مقاومت به علف‌کش‌های با ماندگاری بالا در خاک، چگونه است؟
 ۱) بیشتر
 ۲) کمتر
 ۳) بروز نخواهد کرد.
 ۴) پایداری علف‌کش ارتباطی با مقاومت ندارد.
- ۱۴۱- کدام ترکیب به عنوان یک ماده ضدجلبک (Algicide) نیز کاربرد دارد؟
 ۱) اوریزالین
 ۲) تریاسولفورون
 ۳) سولفات مس
 ۴) سولفوریک اسید
- ۱۴۲- کدام علف‌کش به صورت تماسی باعث ازبین‌رفتن علف‌های هرز هدف می‌شود؟
 ۱) کلتودیم
 ۲) بنتازون
 ۳) فنوکسابرپوپ
 ۴) نیکوسولفورون
- ۱۴۳- مقدار غلظت مصروفی کدام علف‌کش برای کنترل انتخابی علف‌های هرز در چغندر قند، کمتر است؟
 ۱) بتانال
 ۲) پیرامین
 ۳) سافاری
 ۴) گرانستار
- ۱۴۴- مصرف کدام علف‌کش در خاک، باعث ایجاد تورم سلول‌های نوک ریشه می‌شود؟
 ۱) ایمازاتاپیر
 ۲) آلاکلور
 ۳) بوتا کلر
 ۴) پندی متالین
- ۱۴۵- مکانیسم عمل کدام علف‌کش، بازدارندگی از سنتز کلروفیل است؟
 ۱) بازدارندگان تقسیم سلولی
 ۲) بازدارندگان از آنزیم EPSPS
 ۳) بازدارندگان از آنزیم PPO ACCase
- ۱۴۶- در فرایند مطالعه مقاومت، نسبت $\frac{ED_{50}(R)}{ED_{50}(S)}$ نشان‌دهنده کدام است؟
 ۱) درجه مقاومت
 ۲) تکمیل کننده
 ۳) شروع توسعه مقاومت
- ۱۴۷- احتمال جذب کدام ترکیب توسط گندم از طریق خاک بیشتر است؟
 ۱) پاراکوات
 ۲) توفوردی
 ۳) گلیفوسویت
- ۱۴۸- کدام علف هرز در پتانسیل‌های پایین‌تری از رطوبت خاک، قادر به رشد است؟
 ۱) *Kochia scoparia*
 ۲) *Echinochloa colonum*
 ۳) *Oxalis corniculata*
 ۴) *Paspalum distichum*
- ۱۴۹- هورمون آبسیزیک اسید و جیبرلیک اسید به ترتیب، باعث کدام مورد در بذور تاج‌خرروس می‌شوند؟
 ۱) القا - شکست خواب
 ۲) القا - خواب
 ۳) شکست - القا خواب
- ۱۵۰- احتمال وقوع رقابت برای کدام عامل در شرایط مزرعه، بسیار کم است، اما با افزایش مقدار آن می‌توان عملکرد گیاه زراعی را بهبود بخشید؟
 ۱) اکسیژن
 ۲) تسخیر فضا
 ۳) دی‌اکسیدکربن
 ۴) نیتروژن

۱۵۱- در نتیجه انقلاب سبز و معرفی ارقام پاکوتاه گندم، چه تغییری در رقابت گیاه زراعی و علفهای هرز به وجود آمد؟

- ۱) کاهش توانایی رقابت گیاه زراعی با علفهای هرز
- ۲) افزایش توانایی رقابت گیاه زراعی با علفهای هرز
- ۳) توانایی رقابت علفهای هرز و گیاه زراعی متعادل شد.
- ۴) تغییری در توانایی رقابتی علفهای هرز و گیاه زراعی حاصل نشد.

۱۵۲- کدام یک از جنبه‌های مهم پویایی جمعیت علفهای هرز در گذشته، اغلب نادیده گرفته شده است؟

- ۱) خصوصیات زیستگاه علفهای هرز
- ۲) مهاجرت گونه‌ها
- ۳) مسافت انتشار
- ۴) الگوی انتشار اندام‌های تولیدمشابه

۱۵۳- واژه "Colonizing ability" به کدام ویژگی علفهای هرز اشاره دارد؟

- ۱) افزایش سریع جمعیت
- ۲) قدرت انتشار
- ۳) خواست بذر
- ۴) تحمل محدوده وسیعی از شرایط زیستگاه

۱۵۴- در مرحله ورود (Introduction) فرایند هجوم یک گونه علف هرز جدید به یک منطقه بکر (از نظر وجود آن گونه)، کدام فاکتور از اهمیت نسبی بیشتری برخوردار است؟

- ۱) دشمنان طبیعی
- ۲) سرعت رشد نسبی
- ۳) قدرت انتشار
- ۴) مکانیسم خواب

۱۵۵- وقفه زمانی بین تشکیل کلنی سازاری و یومی شدن یک گونه مهاجم چه نام دارد؟

- | | |
|------------|------------|
| Slow Phase | Min Phase |
| Lag Phase | Long Phase |

۱۵۶- در پراکنش غیرفعال (انتشار بدون کمک) بذر علفهای هرز، مسافت انتشار حدوداً چقدر است؟

- ۱) پراکنش ارتباطی با ارتفاع تقریبی گیاه
- ۲-۳-۴) برابر ارتفاع تقریبی گیاه
- ۳-۵) برابر ارتفاع تقریبی گیاه

۱۵۷- کدام عامل نقش کمتری در تغییر دوره سبزشدن بذرهای علف هرز دارد؟

- ۱) درجه حرارت
- ۲) خاک و روزی
- ۳) توزیع عمودی بذور در خاک
- ۴) وقوع بارندگی

۱۵۸- سرعت افزایش جمعیت در شرایط تداخل شدید که هوگونه افزایش جمعیت از طریق زاد و ولد، توسط مرگ و میر افراد خنثی می‌شود، چقدر است؟

- | | |
|--------|-------|
| ۱ < ۲ | ۱ > ۱ |
| ۴) صفر | ۱) ۱ |

۱۵۹- بذر کدام علف هرز در پتریدیش در حضور آب مقطمر، جوانه‌زنی ندارد؟

- ۱) سس
- ۲) داروشن
- ۳) گل جالیز
- ۴) گل ماهور

۱۶۰- ورود اغلب گیاهان مهاجم به مناطق جدید به کدام صورت و با کدام هدف بوده است؟

- ۱) تصادفی - مصارف زراعی
- ۲) تصادفی - مصارف زینتی
- ۳) عمدى - مصارف زینتی
- ۴) عمدى - مصارف زراعی

اکولوژی تولید گیاهان زراعی، کشاورزی اکولوژیک پایدار:

۱۶۱ - کدام مورد، جزو روش‌های اندازه‌گیری مستقیم شاخص سطح برگ (LAI) به شمار می‌رود؟

(۱) پلانیمتر
(۲) استفاده از ابعاد برگ

(۳) شبیه‌سازی شاخص سطح برگ
(۴) استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و سنجش از راه دور

۱۶۲ - منظور از ضریب عملکرد اقتصادی (Coefficient of economic yield) چیست؟

(۱) ضریب تبدیل وزن به قیمت محصول

(۲) نسبت عملکرد به کل زیست‌نوده گیاه

(۳) نسبت شاخص برداشت به قیمت محصول در بازار

(۴) بخشی از کل زیست‌نوده در خاک که در محاسبه شاخص برداشت استفاده نمی‌شود.

۱۶۳ - آیا گیاهان C_4 در مقایسه با گیاهان C_3 ، کارایی کوانتمومی بیشتری دارند؟ به کدام دلیل؟

(۱) خیر - تفسی نوری در گیاهان C_3 ، عملکرد کوانتمومی آنها را افزایش می‌دهد.

(۲) خیر - بدلیل کربوکسیلاتیون اضافی و انتقال غشایی ترکیبات حد واسط

(۳) بلی - بهدلیل واپسی بودن به بازبودن روزنه‌ها خصوصاً در شرایط تنفس نور زیاد و افزایش دما

(۴) بلی - در شرایط نور اکم، عملکرد کوانتمومی گیاهان C_4 بهدلیل مکانیسم‌های فتوسنتری خاص آنها بالاتر است.

۱۶۴ - کدام گاز گلخانه‌ای، بیشترین نقش را در پدیده گرمایش جهانی دارد؟

(۱) اکسیدهای نیتروژن
(۲) کلروفلوروکربن‌ها

(۳) متان
(۴) دی‌اکسید کربن

۱۶۵ - کدام پهنه، مستقیماً با فعالیت‌های کشاورزی مرتبط است؟

(۱) آگرواکولوژیک

(۳) بیوكlimatic

۱۶۶ - در میان ویژگی‌های کانوپی و دینامیک سطح برگ، کدام مورد در رویارویی با تنفس آبی، آخرین فرایندی است که

تأثیر می‌پذیرد؟

(۱) توسعه برگ
(۲) تعرق از برگ

(۳) پیر شدن برگ
(۴) تشکیل برگ

۱۶۷ - عملکرد نسبی در کدام مرحله از زندگی گیاه گندم، کمترین حساسیت را به تنفس آبی دارد؟

(۱) پنجه‌زنی
(۲) پرشدن دانه
(۳) خوشبندی
(۴) سبز شدن

۱۶۸ - در کدام نسبت از $\frac{C}{N}$ ، بقایای گیاهی موجود در خاک نیتروژن غیرآلی شده و برای جذب توسط ریشه، در دسترس خواهد شد؟

(۱) ۴۰-۴۵
(۲) ۳۰-۳۵

(۳) ۲۵-۳۰
(۴) ۲۰-۲۵

۱۶۹ - کدام مورد در خصوص کاربرد منحنی‌های پاسخ به نور (Light Response curves) در اکولوژی تولید، درست است؟

(۱) این منحنی‌ها برای برآورد کارایی مصرف تشعشع (با واحد RUE, g dry matter/MJ PAR) استفاده می‌شوند.

(۲) این منحنی‌ها برای برآورد فتوسنتر ناخالص و تنفس کانوپی به کار می‌روند.

(۳) این منحنی‌ها برای برآورد فتوسنتر ناخالص کانوپی به کار می‌روند.

(۴) این منحنی‌ها در برآورد میزان تعرق کانوپی استفاده می‌شوند.

۱۷۰- چنانچه کارایی مصرف نور اولیه (E) در گندم برابر با $(kg CO_2 / ha / h) / (J / m^2 / s)$ و تشعشع کل روزانه $100 J / m^2 / s$ باشد، سرعت فتوسنترز تکبرگ، کدام است؟

- (۱) 45°
 (۲) 22.5°
 (۳) 45°
 (۴) 225°

۱۷۱- یک رقم ذرت، دارای نیاز دمایی به ترتیب 750° و 500° درجه سلسیوس-روز برای سپری کردن دوران رشد رویشی، زایشی و صفر فیزیولوژیک 10° درجه سلسیوس است. اگر این گیاه در طول دوره رشد، دمای ثابت روزانه 25° درجه سلسیوس را تجربه کند، سرعت نمو گیاه برای هریک از دوره‌های رشد رویشی و زایشی به ترتیب چقدر است؟

- (۱) $33^\circ / 5^\circ$
 (۲) $13^\circ / 2^\circ$
 (۳) $12^\circ / 3^\circ$
 (۴) $0^\circ / 0^\circ$

۱۷۲- کدام مورد در رابطه با تعریف بسته شدن کانوپی گیاهان زراعی، نادرست است؟

- (۱) زمانی بسته می‌شود که به نقطه اشباع نوری کانوپی رسیده باشد.
 (۲) زمانی بسته می‌شود که 95° درصد نور رسیده به بالای کانوپی را دریافت کند.
 (۳) زمانی بسته می‌شود که گیاه زراعی به حداقل شاخص سطح برگ رسیده باشد.
 (۴) زمانی بسته می‌شود که نور رسیده به پایین کانوپی، کمتر از نقطه جبران نوری کانوپی شود.

۱۷۳- کدام رابطه برای تخمین سرعت رشد کانوپی روزانه ($g dry matter m^{-2} d^{-1}$) درست است؟

$$\Delta w / \Delta t = A \times (30/44)$$

$$\Delta w / \Delta t = RUE \times Total Incoming Radiation$$

$$\Delta w / \Delta t = LUE \times Total Incoming Radiation$$

$$\Delta w / \Delta t = CVF \times [A \times (30/44) - (MC \times W)]$$

۱۷۴- در بحث کمی‌سازی تولید، هزینه بیوسنترز (تنفس رشد) کدام ترکیب آلی، از بقیه بیشتر است؟

- (۱) پروتئین‌ها
 (۲) چربی‌ها
 (۳) کربوهیدرات‌ها
 (۴) لیگنین

۱۷۵- ضریب استهلاک نور توسط کانوپی (k)، در کدام بخش از کمی‌سازی تولید، به طور مستقیم نقش دارد؟

- (۱) جذب تشعشع
 (۲) کارایی فتوسنترزی
 (۳) کارایی مصرف تشعشع
 (۴) جذب نیتروژن

۱۷۶- کدام مورد در رابطه با روند و میزان پاسخ کارایی اولیه مصرف نور (کیلوگرم دی اکسید کربن ثبت شده در هکتار سطح برگ در ساعت بهاری هر ژول تشعشع دریافتی در مترمربع در ثانیه) تکبرگ گیاهان زراعی با مسیر فتوسنترزی سه کربنی و چهارکربنی به دماهای 10° ، 20° ، 30° و 40° درجه سلسیوس به ترتیب درست است؟

- (۱) سه کربنی: $0/20^\circ$ ، $0/30^\circ$ ، $0/40^\circ$ و $0/50^\circ$ - چهارکربنی: $0/20^\circ$ ، $0/30^\circ$ ، $0/40^\circ$ و $0/50^\circ$
 (۲) سه کربنی: $0/45^\circ$ ، $0/45^\circ$ و $0/45^\circ$ - چهارکربنی: $0/55^\circ$ ، $0/48^\circ$ ، $0/40^\circ$ و $0/30^\circ$
 (۳) سه کربنی: $0/55^\circ$ ، $0/48^\circ$ ، $0/40^\circ$ و $0/30^\circ$ - چهارکربنی: $0/45^\circ$ ، $0/45^\circ$ ، $0/45^\circ$ و $0/45^\circ$
 (۴) سه کربنی: $0/55^\circ$ ، $0/48^\circ$ و $0/20^\circ$ - چهارکربنی: $0/45^\circ$ ، $0/55^\circ$ ، $0/55^\circ$ و $0/50^\circ$

۱۷۷- اگر وزن تریک گیاه زراعی 100° گرم، وزن خشک آن 50° گرم و وزن تر آن در حالت تورژسانس 130° گرم باشد، محتوای نسبی آب این گیاه چقدر است؟

- (۱) $38/4$
 (۲) 50°
 (۳) $62/5$
 (۴) 160°

۱۷۸- اگر میانگین سرعت رشد کانوپی نخود $d^{-1} = 25 \text{ gm}^{-2}$ ، طول دوره رشد ۱۰۰ روز و شاخص برداشت $5/30$ باشد، عملکرد دانه چقدر است؟

- (۱) ۷۵۰ گرم در هکتار
 (۲) ۷۵۰ گرم در مترمربع
 (۳) ۲۵۰۰ کیلوگرم در هکتار
 (۴) ۷۵۰۰ گرم در مترمربع

۱۷۹- کدام مورد در خصوص تنفس نگهداری و تنفس رشد، درست است؟

- (۱) تنفس رشد، تابعی از بیومس زنده گیاه و دمای هوا است.
 (۲) برای تخمین تنفس رشد کانوپی، از قانون Q10 استفاده می‌شود.
 (۳) واحد اندازه‌گیری هر دو نوع تنفس، $\text{g CH}_2\text{O/g DM}$ است.
 (۴) مفهوم هر دو تنفس یکی است، اما ضرایب آنها در کمی‌سازی تولید متفاوت است.

۱۸۰- کدام مورد، ویژگی اصلی جوامع در تعیین تولید اولیه نیست؟

- (۱) دریافت نور در کانوپی
 (۲) سرعت رشد محصول
 (۳) شاخص سطح برگ
 (۴) فتوسنتز خالص

۱۸۱- اگر غلظت نیتروژن معدنی در عمق ۱۰ سانتی‌متری خاک یک مزرعه ۱۰ پی‌پی‌ام و وزن مخصوص ظاهری خاک آن $1/2$ گرم به‌ازای هر سانتی‌متر مکعب باشد و وزن خاک (بر حسب تن) و محتوای نیتروژن معدنی یک هکتار (بر حسب کیلوگرم) از این مزرعه به ترتیب، چقدر است؟

- (۱) ۱۲۰ و ۱۲
 (۲) ۱۲۰ و ۱۲۰۰
 (۳) ۱۲۰۰ و ۱۲

۱۸۲- کدام مورد در خصوص کارایی اولیه مصرف نیتروژن در عملکرد اقتصادی تر محصول، درست است؟

- (۱) سیب‌زمینی $<$ چغندر قند $<$ گندم
 (۲) چغندر قند $<$ سیب‌زمینی $<$ گندم
 (۳) گندم $<$ سیب‌زمینی $<$ چغندر قند
 (۴) گندم = سیب‌زمینی = چغندر قند

۱۸۳- روند تغییرات نیتروژن آلی بیومس سرپا در طول دوران رشد رویشی و رایشی گیاهان زراعی، به ترتیب، چگونه است؟

- (۱) افزایشی - افزایشی
 (۲) افزایشی - کاهشی
 (۳) کاهشی - افزایشی
 (۴) کاهشی - افزایشی

۱۸۴- اگر عملکرد دانه یک مزرعه گندم ۷۰۰۰ کیلوگرم در هکتار، شاخص برداشت آن ۵۵ درصد، ماده خشک گلیه اندام‌های هوایی در زمان برداشت ۸۵ درصد و غلظت پروتئین دانه و کاه آن به ترتیب ۱۲ درصد و ۳ درصد باشد، این مزرعه گندم حدوداً چند کیلوگرم نیتروژن از هر هکتار خاک برداشت کرده است؟ (نسبت نیتروژن به پروتئین در مولکول پروتئین، یک‌ششم است).

- (۱) ۱۲۰ و ۱۴۰
 (۲) ۱۷۰ و ۱۴۰
 (۳) ۸۶۰ و ۱۷۰
 (۴) ۱۲۰ و ۸۶۰

۱۸۵- اگر در یک روز آفتابی در تابستان، مجموع تشعشع رسیده به بالای یک مزرعه ۳۰ مگاژول در مترمربع، ضریب آبدو خاک و پوشش گیاهی ۲۵ درصد، تشعشع حرارتی خروجی از سطح این مزرعه $8/5$ مگاژول در مترمربع و دمای هوا و برگ، هر کدام ۲۵ درجه سلسیوس باشد، میزان تعرق این مزرعه، چند میلی‌متر در روز است؟ (گرمای نهان تبخیر آب، ۲۵۰۰ کیلوژول به ازای هر کیلوگرم آب است).

- (۱) ۹
 (۲) ۷/۵
 (۳) ۶/۴
 (۴) ۵/۶

۱۸۶- چالش اصلی کاربرد پسماندهای گیاهی در مناطق گرم و خشک، کدام است؟

- (۱) قیمت بالای پسماندهای گیاهی
 (۲) کمبود و توزیع نامناسب بارندگی
 (۳) استفاده از پسماندهای گیاهی برای تغذیه دام
 (۴) سرعت کمتر فرایندهای تجزیه و تخریب در این مناطق

- ۱۸۷ - کدام مورد، جزو عناصر برنامه گذار به کشاورزی ارگانیک است؟**
- (۱) انتقال خاک به مزرعه
 - (۲) تدوین یک تناوب زراعی دقیق
 - (۳) شخم عمیق
 - (۴) کاهش نیروی کار
- ۱۸۸ - در مزارعی که تولید هم‌زمان محصولات ارگانیک و غیر ارگانیک صورت می‌گیرد، استفاده از بذر ترا ریخته، چه حکمی دارد؟**
- (۱) تحت هیچ شرایطی، در هیچ‌یک از سامانه‌ها مجاز نیست.
 - (۲) در هر دو سامانه، به میزان کم تا ده درصد مزرعه بلامانع است.
 - (۳) در سامانه رایج اشکالی ندارد، اما در سامانه ارگانیک ممنوع است.
 - (۴) به شرطی که بخش ارگانیک از غیر ارگانیک حداقل ۱۰ متر فاصله داشته باشد، کشت آن در سامانه غیر ارگانیک بلامانع است.
- ۱۸۹ - علامت «T2» در برچسب ارگانیک، به کدام معنا است؟**
- (۱) تا دو سال اعتبار دارد.
 - (۲) سال دوم گواهی ارگانیک است.
 - (۳) گواهی شده توسط دو بازرس است.
- ۱۹۰ - کاربرد هیدرولوژیک در کشاورزی ارگانیک، چه حکمی دارد؟**
- (۱) مجاز نیست.
 - (۲) تنها در سبزی و صیفی، مجاز است.
 - (۳) اگر از ترکیبات بیوپلیتامیک استفاده شود، مجاز است.
 - (۴) اگر از کودهای معدنی نیتروژن دار استفاده شود، مجاز است.
- ۱۹۱ - در کدام شرایط، به ترتیب، رشد ریشه‌های گردای و نابه‌جل در غلات، بیشتر می‌شود؟**
- (۱) وجود رطوبت کافی در سطح خاک و در لایه عمقی خاک
 - (۲) عدم وجود رطوبت کافی در لایه‌های سطحی و عمقی خاک
 - (۳) کمتر بودن میزان رطوبت از ظرفیت زراعی در لایه‌های سطحی و عمقی خاک
 - (۴) بیشتر بودن میزان رطوبت از ظرفیت زراعی در لایه‌های سطحی و عمقی خاک
- ۱۹۲ - تنوع در یک اکوسیستم گیاهی، به وسیله کدام عامل (عوامل) مشخص می‌شود؟**
- (۱) تنوع گونه‌ها
 - (۲) تعداد گونه‌ها
 - (۳) غنای گونه‌ها
 - (۴) تعداد و تنوع گونه‌ای
- ۱۹۳ - قابلیت برگشت، انعطاف و استقلال داخلی در اکوسیستم‌های پایدار کشاورزی، به ترتیب، به چه میزان است؟**
- (۱) زیاد - زیاد - کم
 - (۲) زیاد - کم - متوسط
 - (۳) کم - زیاد - متوسط
 - (۴) متوسط - متوسط - زیاد
- ۱۹۴ - علف‌کش‌های قارچی را در کدام حالت می‌توان استفاده کرد؟**
- (۱) کنترل علف‌های هرز چندساله موجود در گیاهان زراعی دوساله
 - (۲) کنترل علف‌های هرز دوساله موجود در گیاهان زراعی دوساله
 - (۳) کنترل علف‌های هرز یکساله موجود در گیاهان زراعی یکساله
 - (۴) کنترل علف‌های هرز یکساله موجود در گیاهان زراعی دوساله
- ۱۹۵ - نسبت نور $\frac{R}{FR}$ در پایین کانوپی گیاهان زراعی، چند است؟**
- (۱) $^{\circ}/2$
 - (۲) $^{\circ}/5$
 - (۳) $^{\circ}/8$
 - (۴) $^{\circ}/15$
- ۱۹۶ - مهم‌ترین عامل محدودکننده عملکرد گیاهان زراعی در نظام‌های کشاورزی ایران، کدام است؟**
- (۱) آب
 - (۲) تشعشع
 - (۳) شوری
 - (۴) ماده آلی خاک

- ۱۹۷- دلیل کاهش جمعیت علف‌های هرز پس از چند سال کاربرد روش بی‌خاک ورزی و کم‌خاک ورزی، کدام است؟
- (۱) افزایش تهווیه خاک
 - (۲) کاهش مواد آلی خاک
 - (۳) عدم امکان رشد علف‌های هرز
- ۱۹۸- حد مجاز بقایای علف‌کش آترازین در مزارع ذرت ارگانیک، چند پی‌پی‌ام است؟
- (۱) صفر
 - (۲) ۸
 - (۳) ۱۲
 - (۴) ۱۶
- ۱۹۹- کدام عنصر، با یکدیگر برهم‌کنش مثبت (هم‌افزایی) دارد؟
- (۱) نیتروژن - آهن
 - (۲) فسفر - آهن
 - (۳) فسفر - نیتروژن
- ۲۰۰- کدام گیاه زراعی دارای خاصیت دگرآسیبی (آللوپاتی) است؟
- (۱) ینبه
 - (۲) چندرقند
 - (۳) سوگورم
 - (۴) سیب‌زمینی
- ۲۰۱- اگر عملکرد گندم در یک مزرعه ۴ هکتاری، ۴ تن در هکتار و مجموع آب مصرفی این مزرعه ۲۰ هزار مترمکعب باشد، کارایی مصرف آب این مزرعه، کدام است؟
- (۱) ۰/۲
 - (۲) ۰/۸
 - (۳) ۵
 - (۴) ۱/۲۵
- ۲۰۲- اگر شاخص برداشت یک رقم ذرت ۴۰ و بیومس اندام‌های رویشی آن ۱۵ تن در هکتار باشد، مقدار بیومس کل تولیدی در هکتار، چند است؟
- (۱) ۹
 - (۲) ۲۱
 - (۳) ۱۸
 - (۴) ۲۵
- ۲۰۳- اگر عملکرد ذرت و لوبیا در کشت خالص آنها به ترتیب ۸ و ۲ تن در هکتار و عملکرد آنها در کشت مخلوط ۶ و ۱/۵ تن در هکتار باشد، نسبت برابری زمین (LER) در این کشت مخلوط کدام است؟
- (۱) ۰/۶۵
 - (۲) ۰/۱۵
 - (۳) ۱/۷۷
 - (۴) ۲/۶۶
- ۲۰۴- در نظام‌های چندکشتی، گیاهان تثبیت‌کننده نیتروژن همراه با گیاه اصلی، بیانگر کدام حالت هستند؟
- (۱) Resource conservation
 - (۲) Niche differentiation
 - (۳) Facilitation
 - (۴) Resource partitioning
- ۲۰۵- کدام مورد، از مشخصه‌های بوم‌نظام‌های کشاورزی پایدار نیست؟
- (۱) مبتنی بر اهداف بلندمدت
 - (۲) عدم نیاز به مدیریت پیچیده
 - (۳) پرنهاوه از نظر نهاده‌های اطلاعاتی
 - (۴) وابستگی به نهاده‌های درون‌مزرعه‌ای
- ۲۰۶- در کدام حالت، تنوع از هر دو بعد مکانی و زمانی، در اکوسیستم کشاورزی برقرار است؟
- (۱) Sole cropping
 - (۲) Crop rotation
 - (۳) Sequential cropping
 - (۴) Simultaneous cropping
- ۲۰۷- یکی از شرایط موفقیت کشت مخلوط در خصوص استفاده از منابع، کدام است؟
- (۱) حالت همگرا داشته باشد.
 - (۲) حالت واگرا داشته باشد.
 - (۳) در استفاده از منابع، تفاوت زیادی نداشته باشد.
 - (۴) در مقایسه با کشت خالص، منابع کمتری مصرف شود.

- ۲۰۸ - کدام مورد، از عوامل موافقیت در سیستم چند کشتی محسوب نمی شود؟
- ۱) تمایز نیچ
 - ۲) تسهیل کنندگی
 - ۳) رقابت بین گونه‌ای بالا
 - ۴) الگوی ریشه‌ای متفاوت
- ۲۰۹ - کدام مورد در خصوص کارکردهای تنوع زیستی در یک آگرواکوسیستم، «اشتباه» است؟
- ۱) ترسیب کربن
 - ۲) ایجاد تعادل در ماده آلی خاک
 - ۳) کاهش هجوم گونه‌های مضر
 - ۴) عدم تجزیه آلینده‌های مضر
- ۲۱۰ - تنوع زیستی بین زیستگاهها یا تغییر در تنوع گونه‌ای در بین بوم نظام‌ها، بیانگر کدام نوع تنوع است؟
- ۱) آلفا
 - ۲) اپسیلن
 - ۳) بتا
 - ۴) گاما

www.Sanjesh3.com