

کد کنترل

۲۲۸

A

۲۲۸A

عصر جمعه
۱۴۰۲/۱۲/۰۴



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

در زمینه مسائل علمی، پایداری انسان قلم بود.
فکام مفظی رهبری

آزمون ورودی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل - سال ۱۴۰۳

حشره‌شناسی کشاورزی (کد ۱۳۱۴ - (شاور))

مدت زمان پاسخگویی: ۱۳۵ دققه

تعداد سؤال: ۱۲۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤال‌ها

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)	۲۵	۱	۲۵
۲	جانورشناسی	۲۰	۲۶	۴۵
۳	حشره‌شناسی	۲۵	۴۶	۷۰
۴	آفات گیاهی	۳۰	۷۱	۱۰۰
۵	اصول مبارزه و سم‌شناسی در آفات گیاهی	۲۵	۱۰۱	۱۲۵

این آزمون، نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

حق چاپ، تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برابر مقررات رفتار می‌شود.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول زیر، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخنامه و دفترچه سوالها، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سوالها و پایین پاسخنامه ام را تأیید می نمایم.

امضا:

زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی):

PART A: Vocabulary

Directions: Choose the word or phrase (1), (2), (3), or (4) that best completes each sentence. Then mark the answer on your answer sheet.

- 1- If you want to excel at what you love and take your skills to the next level, you need to make a to both yourself and your craft.
 1) commitment 2) passion 3) statement 4) venture
- 2- It is usually difficult to clearly between fact and fiction in her books.
 1) gloat 2) rely 3) raise 4) distinguish
- 3- Some people seem to lack a moral , but those who have one are capable of making the right choice when confronted with difficult decisions.
 1) aspect 2) compass 3) dilemma 4) sensation
- 4- The factual error may be insignificant; but it is surprising in a book put out by a/an academic publisher.
 1) complacent 2) incipient 3) prestigious 4) notorious
- 5- In a society conditioned for instant , most people want quick results.
 1) marrow 2) gratification 3) spontaneity 4) consternation
- 6- One medically-qualified official was that a product could be so beneficial and yet not have its medical benefit matched by commensurate commercial opportunity.
 1) incredulous 2) quintessential 3) appeased 4) exhilarated
- 7- Some aspects of zoological gardens always me, because animals are put there expressly for the entertainment of the public.
 1) deliberate 2) surmise 3) patronize 4) appall

PART B: Cloze Test

Directions: Read the following passage and decide which choice (1), (2), (3), or (4) best fits each space. Then mark the correct choice on your answer sheet.

Online learning has been around for years, but it really took off during the COVID-19 pandemic. Many schools and universities (8) transition to online learning, and this trend is likely to continue in the future. There

are many benefits to online learning, (9)
 accessibility and flexibility. Students can learn at their own pace, and from anywhere in the world. Online learning (10) affordable than traditional in-person learning, making education more accessible to a wider range of students.

- | | | |
|-----|---|---|
| 8- | 1) forced to
3) were forced to | 2) have forced
4) forcing |
| 9- | 1) including increased
3) and increase | 2) they include increasing
4) they are increased |
| 10- | 1) is also more
3) which is also more | 2) also to be more
4) is also so |

PART C: Reading Comprehension

Directions: Read the following three passages and answer the questions by choosing the best choice (1), (2), (3), or (4). Then mark the correct choice on your answer sheet.

PASSAGE 1:

Caterpillars are voracious eaters, and can defoliate a plant in a short period of time. Telltale symptoms of a caterpillar infestation are holes in leaves and chewed leaf edges, as well as leaves that are rolled up or fastened with silk.

If you are able to catch the infestation early on, the best strategy for controlling caterpillars is to handpick them, then crush them or drop them in a pail of soapy water. Make sure you also remove rolled or folded leaves that shelter the caterpillars (Make sure you wear gloves before handling Saddleback caterpillars, as their sting is severe). To prevent inadvertently killing desirable butterflies- and moths-to-be, use a good field guide such as Peterson First Guide to Caterpillars and pick only those caterpillars which become drab adults.

Cleanup and disposal of garden debris throughout the growing season, followed by a thorough end-of-season cleanup, will help reduce the size of future generations of caterpillars. Furthermore, many insects prey upon or parasitize caterpillars, and will gladly assist you in your quest to keep caterpillar numbers under control.

- 11- **Caterpillars, according to the passage, can**
 1) create a length of tied-together twigs
 2) be a major threat to survival of a plant
 3) eat all the leaves and stems of a plant quickly
 4) damage a plant by eating its root, stems and leaves
- 12- **All of the following, as stated in the passage, are telltale signs of a caterpillar attack EXCEPT**
 1) chewed leaf edges
 2) rolled or folded leaves
 3) silky or bright leaves
 4) holes in the leaves

- 13- It's mentioned in the passage that Peterson First Guide to Caterpillars can
1) advise you how to make your gardens safe
2) warn you that caterpillars have sever stings
3) help you to remove just harmful caterpillars
4) show you the way of catching the infestation early on

14- The word "inadvertently" in paragraph 2 is closest in meaning to
1) finally 2) ineffectively 3) regularly 4) unknowingly

15- According to paragraph 3,
1) caterpillars prey on many useful insects
2) garden debris is a desirable place for caterpillars
3) cleaning up the gardens reduces the size of future generations of plants
4) controlling caterpillars should be done at the end of the seasons

PASSAGE 2:

Sucking insects remove cell contents or sap and thereby weaken the plants. Some of these sucking insects inject salivary fluids into plants. This secretion may kill plants, as evidenced by armored scale feeding, cause galls to form, as in the case of gall aphids, or kill portions of a leaf, as seen in leafhopper "burn." Sucking insects tend to ingest more water and sugars than amino acids. They balance their nutrition by excreting the excess sugar-water as honeydew, which is objectionably sticky and supports the growth of sooty mold. Honeydew can also lure nuisance stinging wasps, and also attracts ants, which protect the sucking aphids from predators and parasites. One key to managing populations of honeydew-producing insects is to control the ants that protect them.

Insertion of sucking mouthparts into plants increases potential for the transmission of plant disease organisms. Sucking insects, such as leafhoppers moving among plants can transmit mycoplasma-like organisms that cause Peach X-disease and aster yellows. Aphids and leafhoppers transmit viruses to plants. Preventing the transmission of viruses can be the chief reason to control certain insects.

- 20- The writer's tone in this passage is
 1) critical 2) instructive 3) pessimistic 4) subjective

PASSAGE 3:

Bacterial canker is a common and sometimes lethal disease of trees in the genus Prunes including cherry, plum and peach. Often branch dieback is the first symptom of bacterial canker that homeowners notice. However, other more subtle symptoms of flowers, leaves, fruits and branches typically precede this dieback. Initially, infected trees are symptomless. Infected flowers often open, but then collapse. Infected leaves become spotted and yellowed. Flower, fruit and branch infections can become systemic, leading to twig dieback, death of larger branches or even death of an entire tree.

Healthy trees are better able to slow the development of bacterial canker. Therefore make sure that trees are watered and fertilized properly. Keep weeds and other plants that may harbor bacterial canker pathogens from around the base of susceptible trees. Copper-containing sprays have been advocated for bacterial canker management. However, in many areas, copper-resistant strains of Pss and Psm are present and therefore copper sprays are ineffective.

- 21- Branch dieback in fruit trees, according to the passage, is
 1) the first noticeable sign of bacterial canker
 2) the only common symptom of disease in trees
 3) the only sign of disease found by homeowners
 4) the most lethal disease especially fruit trees
- 22- The word "subtle" in paragraph 1 is closest in meaning to
 1) negative 2) physical 3) less obvious 4) visible
- 23- Tree flowers infected with bacterial canker
 1) are often symptomless 2) usually fall after opening
 3) become spotted and colorless 4) can infect the entire body of a tree
- 24- Watering and fertilizing properly are two main factors to
 1) guarantee the health and vitality of a tree
 2) keep weeds and other plants around a tree
 3) make the soil pathogens vanish and disappear
 4) prevent disease-prone trees from falling or dying
- 25- Paragraph 2 is mainly about
 1) inefficiency of copper sprays
 2) the development of bacterial canker
 3) harboring bacterial canker pathogens
 4) avoiding problems with bacterial canker

جانورشناسی:

- ۲۶- در چرخه زندگی **Theileria**, گامتوسیت در کدام ناحیه و در کدام موجود زنده تشکیل می‌شود؟
 ۱) اریتروسیت - دام ۲) دستگاه گوارش - کنه ۳) غدد بزاقی - کنه ۴) لغوسیت - دام
- ۲۷- سیکلوبس (**cyclops**), میزبان واسط کدامیک از کرم‌های انگل زیر بهشمار می‌رود؟
 ۱) تریشین ۲) سنجاقی ۳) فیلاریا ۴) گینه

- ۲۸ - چشم مرکب در کدام گروه از بندپایان به طور کلی وجود ندارد؟
- | | |
|---------------|---------------|
| Crustacea (۲) | Arachnida (۱) |
| Xiphosura (۴) | Chilopoda (۳) |
- ۲۹ - تنها راسته سختپوستان (Crustacea) که به طور کامل در خشکی زندگی می‌کند، چه نام دارد؟
- | | |
|-----------------|---------------|
| Decapoda (۲) | Amphipoda (۱) |
| Stomatopoda (۴) | Isopoda (۳) |
- ۳۰ - غده «Ovotestis» در کدام جانور وجود دارد؟
- | | |
|---------------|--------------|
| (۱) پرندگان | (۲) حلوون‌ها |
| (۳) خارپوستان | (۴) کنه‌ها |
- ۳۱ - اولین تقسیمات در کدام نوع از تخم‌ها، مساوی ولی ناکامل است؟
- | | |
|-------------------|-------------------|
| Centrolecithe (۲) | Alecithe (۱) |
| Telolecithe (۴) | Heterolecithe (۳) |
- ۳۲ - حلوون‌های خشکی‌زی که به جای آب‌شش، ریه دارند به کدام رده از شاخه نرم‌تنان تعلق دارند؟
- | | |
|--------------------|-----------------|
| Gasteropoda (۲) | Cephalopoda (۱) |
| Polyplacophora (۴) | Pelecypoda (۳) |
- ۳۳ - فقدان وسیله حرکتی، داشتن زندگی انگلی و انتقال به وسیله بندپایان ناقل، از ویژگی‌های کدام شاخه آغازیان (Protozoa) است؟
- | | |
|-----------------------|-----------------|
| Microspora (۲) | Apicomplexa (۱) |
| Sarcomastigophora (۴) | Myxozoa (۳) |
- ۳۴ - در چرخه زندگی کپلک کبد، آلوگی گوسفند پس از پیغاین کدام مرحله به وقوع می‌پیوندد؟
- | | |
|----------------|----------------|
| (۱) اسپرسوسيست | (۲) ردی |
| (۳) متراسرکر | (۴) میراسیدیوم |
- ۳۵ - کدام مرحله رشدی کرم «*Echinococcus granulosus*» در بدن انسان زندگی می‌کند و کیست هیدراتید تولید می‌کند؟
- | | |
|----------------|-----------------|
| Miracidium (۲) | Cysticercus (۱) |
| Redia (۴) | Oncosphere (۳) |
- ۳۶ - ژمول (Gemmule) در کدام فرایند مربوط به اسفنج‌ها، مؤثر است؟
- | |
|---------------------------|
| (۱) بقاء در شرایط خشکسالی |
| (۲) تولید مثل جنسی |
| (۳) هضم و جذب |
- ۳۷ - لارو تریشن خوک (Trichinella) در کدام بخش از بدن خوک زندگی می‌کند؟
- | |
|------------|
| (۱) روده |
| (۲) شش |
| (۳) کبد |
| (۴) ماهیچه |
- ۳۸ - شباهت بین پروتوكوردادا (Protochordata) و همی کوردادا (Hemichordata) در کدام است؟
- | |
|-------------------------------|
| (۱) انگل انحصاری بودن |
| (۲) سامانه عصبی تو خالی و تکی |
| (۳) ساکن بودن در آب‌های شور |
| (۴) وجود طناب عصبی |
- ۳۹ - مایع درونی دستگاه گردش خون در کدام شاخه جانوری، حاوی «آب دریا» است؟
- | |
|----------------|
| (۱) اسفنج‌ها |
| (۲) دهان‌گردان |
| (۳) خارپوستان |
| (۴) مرجانیان |
- ۴۰ - کدام جانوران، پیدایش احتمالی بندپایان از یک جد کرم حلقوی‌مانند را نشان می‌دهند؟
- | | |
|-----------------|----------------|
| Onychophora (۲) | Annelida (۱) |
| Tardigrada (۴) | Paupropoda (۳) |

- ۴۱ - بیماری پافیلی از عوارض ابتلاء به کدام انگل است؟

- (۱) کرم آسکاریس (۲) شیستوزوما (۳) کرم خوک (۴) کرم فیلاریا

- ۴۲ - در کدامیک از رددهای نرم تنان، آبشش‌ها به صورت صفحات تیغه‌ای دیده می‌شوند؟

- (۱) دوکفه‌ای‌ها (۲) سرپایان (۳) شکم‌پایان (۴) کیتون‌ها

- ۴۳ - فلس در سوف ماهی‌ها (*Percidae*) از کدام نوع است؟

- Cycloid (۲) Ctenoid (۱)

- Placoid (۴) Ganoid (۳)

- ۴۴ - اندام موسوم به جاکوبسون (*Jacobson*) در کدام گروه دیده می‌شود؟

- (۱) پستانداران (۲) خزندگان (۳) دوزیستان (۴) ماهی‌ها

- ۴۵ - در کدام ماهی، دم از نوع *Heterocercal* می‌باشد؟

- (۱) آزادماهی (۲) ماهی شش‌دار (۳) ماهی قزل‌آلا (۴) کوسه ماهی

حشره‌شناسی

- ۴۶ - منشاء گره‌های عصبی در طناب عصبی حشرات از تکثیر کدام مورد است؟

- (۱) سلول‌های گلیال با منشاً انودرمی (۲) سلول‌های گلیال با منشاً اکتودرمی

- (۳) نوروبلاست‌ها با منشاً انودرمی (۴) نوروبلاست‌ها با منشاً اکتودرمی

- ۴۷ - پیوست‌های کوتیکولی که دارای سلول‌های اپیدرمی هستند، چه نام دارند؟

- (۱) آپوفیز (۲) آپودم

- (۳) تاندوفیبریل (۴) فرورفتگی‌های خطی Stries

- ۴۸ - سیستم بینایی به روش تصاویر روی هم در چشم مرکب در کدام گروه حشرات دیده می‌شود؟

- (۱) پروانه‌ها

- (۳) سن‌ها

- ۴۹ - نقش اصلی پرده دور غذا در حشرات تعذیه‌کننده از مایعات چیست؟

- (۱) جلوگیری از نفوذ پاتوژن‌ها به داخل همولنف

- (۲) جلوگیری از نفوذ مواد سمی گیاهی به داخل همولنف

- (۳) بخش‌بندی معده و ایجاد فضاهای خارج و درون پرده دور غذا

- (۴) جلوگیری از سایش سلول‌های معده توسط ذرات غذا

- ۵۰ - منشاً پرده پایه «Basement membrane» در پوست حشرات کدام نوع سلول‌ها است؟

- (۱) اپیدرمی و انسوست (۲) مزودرمی و انسوست

- (۳) اپیدرمی و خونی پلاسماتوسیت (۴) مزودرمی و خونی پلاسماتوسیت

- ۵۱ - کدام مورد به طور معمول فقط در مراحل قبل از بلوغ در حشرات دیده می‌شود؟

- Corpora allata (۲) Corpora Cardiaca (۱)

- Neurosecretory cells (۴) Prothoracic glands (۳)

- ۵۲ - معمول ترین شکل تأمین انرژی در بیشتر حشرات با کدام ماده است؟

- (۱) تره‌هالوز (۲) ساکارز

- (۴) مالتوز (۳) گلوکز

-۵۳- هورمون Prothoracicotropic (PTTH) به ترتیب در کجا تولید و ذخیره می‌شود؟

(۱) غدد پیش قفس سینه - اجسام کاردیاکا

(۲) غدد پیش قفس سینه - اجسام آلاتا

(۳) سلول‌های عصبی ترشحی میانی مغز اول - اجسام آلاتا

(۴) سلول‌های عصبی ترشحی میانی مغز اول - اجسام کاردیاکا

-۵۴- در کدام حشرات، هضم برون دهانی دیده می‌شود؟

(۱) لاروهای شبپره‌ها (۲) ناجور بالان شکارگر (۳) راستبالان (۴) موریانه‌ها

-۵۵- در شاخک حشرات زیرده «pterygota» ماهیچه در کدام بندهای شاخک وجود دارد؟

(۱) همه حلقه‌های شاخک (۲) فقط بند اول شاخک

(۳) همه حلقه‌ها به جز حلقه انتهایی (۴) بند اول و دوم شاخک و بند مقابل آخر

-۵۶- نوع «Hamulate» اتصال بال‌ها به یکدیگر در کدام حشرات مشاهده می‌شود؟

(۱) پروانه (۲) زنبور عسل (۳) سن (۴) ملخ

-۵۷- در طبقه پندری حشرات به راسته‌های مختلف، کدام صفات نقش اساسی دارند؟

(۱) ساختمان بال و قطعات دهانی - نوع رشد و نمو جنینی

(۲) ساختمان سر و قفسه سینه - نوع رشد و نمو جنینی

(۳) ساختمان بال و قطعات دهانی - نوع دگردیسی

(۴) ساختمان سر و قفسه سینه - نوع دگردیسی

-۵۸- کدام مورد در خصوص شپش‌های «Anoplura» درست است؟

(۱) قطعات دهانی مکنده - سرباریکتر از قفسه سینه - اکثراً دارای یک یا چند میزان محدود

(۲) قطعات دهانی جونده - سرباریکتر از قفسه سینه - اکثراً دارای یک یا چند میزان محدود

(۳) قطعات دهانی مکنده - سرعیض‌تر از قفسه سینه - اکثراً دارای دامنه میزانی وسیع

(۴) قطعات دهانی جونده - سرعیض‌تر از قفسه سینه - اکثراً دارای دامنه میزانی وسیع

-۵۹- در کدام گروه از راستبالان، پنجه پاها یک یا دو بنده است؟

(۱) Tridactylidae (۲) Tetrigidae (۳) Tanaoceridae (۴) Eumastacidae

-۶۰- کدام یک از نواحی بال در سن‌ها، معادل ناحیه آنال است؟

(۱) Embolium (۲) Cuneus (۳) Corium (۴) Clavus

-۶۱- وجود رگبال دروغین (Spurious vein) در بین رگبال‌های شعاعی و میانی، مشخصه کدام خانواده است؟

(۱) Syrphidae (۲) Empididae (۳) Bombyliidae (۴) Asilidae

-۶۲- کدام مورد در قطعات دهانی، فقط یک کانال برای تزریق بزاق و مکیدن غذا وجود دارد؟

(۱) بالپولکداران (Lepidoptera) (۲) پشه‌های ماده (Culicidae)

(۳) تریپس‌ها (Thysanoptera) (۴) خرطوم مفصلی‌ها (Hemiptera)

-۶۳- در کدام پدیده، لارو دارای بلوغ جنسی بوده و قادر به تولیدمثل دوجنسی است؟

(۱) Hermaphroditism (۲) Paedogenesis (۳) Gynandromorph

(۴) Neoteny

-۶۴- لب بالا از کدام مورد، عصب دریافت می‌کند؟

(۱) مغز اول (۲) مغز دوم

(۳) مغز سوم (۴) گره‌های قفس سینه

- ۶۵ - تنظیم حرکات روده در حشرات، توسط کدام مورد کنترل می‌شود؟
 ۱) اجسام آلاتا
 ۲) اجسام کاردیاکا
 ۳) هورمون PTTH
 ۴) غدد پیش قفس سینه
- ۶۶ - عضو نیمپانال در زنجره‌های خانواده Cicadidae در کدام قسمت قرار دارد؟
 ۱) بند اول شکم
 ۲) بند دوم شکم
 ۳) ساق پاهای جلویی
 ۴) ساق پاهای عقبی
- ۶۷ - کanal غذایی پشه‌ها بین کدام دو جزء قطعات دهانی تشکیل می‌شود؟
 ۱) آرواره بالا و هیپوفارنکس
 ۲) اپیفارنکس و آرواره پایین
 ۳) هیپوفارنکس و آرواره بالا
 ۴) لب بالا و آرواره بالا
- ۶۸ - اعضای بینایی بازیکونیکا (Basiconica) در کدام مورد دیده می‌شود؟
 ۱) شاخک مورچمه‌ها
 ۲) شاخک شته‌ها
 ۳) قفس سینه سن‌ها
 ۴) ساق پای ملخ‌های شاخک بلند
- ۶۹ - وجود شیار طولی Prosternal و خرطوم ۳ مفصل کوتاه، ویژگی کدام یک از خانواده‌های سن‌ها است؟
 Tingidae (۴) Reduviidae (۳) Nepidae (۲) Miridae (۱)
 Phylloxeridae (۴) Eriosomatidae (۳) Adelgidae (۲) Aphididae (۱)

آفات گیاهی:

- ۷۱ - زنبور پارازیتوئید (Encarsia formosa)، کدام مرحله زیستی سفیدبالک گلخانه را برای تخم‌گذاری انتخاب می‌کند؟
 ۱) حشرات بالغ یک‌روزه
 ۲) نابالغ متحرک
 ۳) تخم‌های تازه گذاشته شده
 ۴) پوره‌ها، پیویسه پوره‌های سن آخر
- ۷۲ - کدام کنه، پیازهای زعفران را در مزارع و انبارها مورد حمله قرار می‌دهد؟
 Rhizoglyphus echinopus (۲) Glycyphagus destructor (۱)
 Polyphagotarsonemus latus (۴) Tyrophagus putrescentiae (۳)
 Sitotroga cerealella (۲) Plodia interpunctella (۱)
 Phthorimaea operculella (۴) Tinea pellionella (۳)
- ۷۳ - کدام مورد درباره سوسک سیاه قالی (Attagenus piceus) درست است؟
 ۱) به قبیله Anthrenini تعلق دارد و هم‌خواری بین آنها، شدید است.
 ۲) برخلاف سایر حشرات همین خانواده، بهندرت به خوردن فراورده‌های حیوانی تمایل نشان می‌دهد.
 ۳) لاروها به‌واسطه داشتن پیوست Urogomphie در حلقه آخر بدن، قابل تشخیص هستند.
 ۴) یکی از دشمنان خط‌نراک کلکسیون‌های موزه‌های جانورشناسی و پیله‌های کرم ابریشم است.
- ۷۴ - کدام یک از حشرات زیر در مزارع چقدر قند، دارای فعالیت تارتنی هستند؟
 Lita ocellata (۲) Agrotis segetum (۱)
 Spodoptera exigua (۴) Phytometra gamma (۳)
- ۷۵ - کدام حشره، مهم‌ترین عامل کنترل شته لگومینوز در مزارع یونجه است؟
 Anthocoris confusus (۲) Draecocoris pallens (۱)
 Concinella septempunctata (۴) Hypodamia variegata (۳)

- ۷۷ زنبور پارازیتoid «*Apanteles glomeratus*»، کدام آفت خانواده چلیپائیان را انگلی می‌کند؟
- | | |
|--|--|
| <i>Hellula undalis</i> (۲)
<i>Entomoscelis adonidis</i> (۴) | <i>Pieris rapae</i> (۱)
<i>Plutela xylostella</i> (۳) |
|--|--|
- ۷۸ لارو و حشره کامل کدام آفت، با تغذیه از برگ‌های هندوانه و توری کردن آنها، به این محصول خسارت وارد می‌کند؟
- | | |
|--|---------------------------------------|
| (۲) سرخرطومی یونجه
(۴) کفشدوزک ۱۲ نقطه‌ای | (۱) عروسک خربزه
(۳) سرخرطومی جالیز |
|--|---------------------------------------|
- ۷۹ کنه «*Aculops lycopersici*»، گیاهان کدام خانواده را بیشتر مورد حمله قرار می‌دهد؟
- | | |
|---|--|
| <i>Cucurbitaceae</i> (۲)
<i>Solanaceae</i> (۴) | <i>Brassicaceae</i> (۱)
<i>Fabaceae</i> (۳) |
|---|--|
- ۸۰ کشت سیب‌زمینی پس از گندم، منجر به افزایش تراکم کدام آفت و افزایش خسارت به سیب‌زمینی می‌شود؟
- | | |
|---|---|
| (۲) زنجرک سیب‌زمینی
(۴) سوسک کلرادوی سیب‌زمینی | (۱) بید سیب‌زمینی
(۳) کرم مفتولی سیب‌زمینی |
|---|---|
- ۸۱ خسارت کدام گونه، فقط در مزرعه مشاهده می‌شود؟
- | | |
|---|---|
| <i>Rhizopelta domenica</i> (۲)
<i>Acanthoscelides obtectus</i> (۴) | <i>Bruchus pisorum</i> (۱)
<i>Callosobruchus chinensis</i> (۳) |
|---|---|
- ۸۲ کدام مورد، بهترین زمان سهم پاشی بر علیه کرم ساقه‌خوار برنج (*Chilo suppressalis*) است؟
- | | |
|---|--|
| (۲) لاروهای سنین پایین
(۴) لاروهای سن یک | (۱) تخم و لاروهای سن یک
(۳) تخم و لارو فقط در نسل اول |
|---|--|
- ۸۳ در کدام قسمت یوله گندم، تغذیه و خسارت وارد می‌کند؟ *Porphyrophora tritici*
- | | |
|---|--|
| (۲) لاره‌لای پشمیله
(۴) لاره‌لای ریشه‌ها | (۱) سطح زیر برگ
(۳) تمام اندام‌های گیاه |
|---|--|
- ۸۴ استفاده از نوار چسبینده دور تنه درخت، در کنترل کدام آفت کارایی دارد؟
- | | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| (۱) ابریشم باف ناجور
(۳) کرم خراط | (۲) پروانه زنبورمانند |
|--------------------------------------|-----------------------|
- ۸۵ سوسک برگ خوار نارون، متعلق به کدام خانواده است؟
- | | |
|---|--|
| <i>Elateridae</i> (۲)
<i>Pyralidae</i> (۴) | <i>Chrysomelidae</i> (۱)
<i>Noctuidae</i> (۳) |
|---|--|
- ۸۶ شیوع بیماری قارچی فتیله نارنجی (*Cytospora*) با فعالیت تغذیه‌ای کدام خانواده از حشرات مرتبط است؟
- | | |
|---------------------|--|
| <i>Sesiidae</i> (۴) | <i>Scolytidae</i> (۳)
<i>Cerambycidae</i> (۲)
<i>Buprestidae</i> (۱) |
|---------------------|--|
- ۸۷ مینوز لکه‌گرد درختان میوه «*Leucoptera scitella*»، چند نسل در سال دارد؟
- | | | |
|-------------------|-----------------------------|--------|
| (۴) هر دو سال، یک | (۳) بیش از ۱۵
(۲) ۲ تا ۴ | (۱) یک |
|-------------------|-----------------------------|--------|
- ۸۸ گونه‌های اهلی و وحشی درختان پسته، میزبان کدام گونه است؟
- | | |
|--|---|
| <i>Haplocampa minuta</i> (۲)
<i>Haplocampa brevis</i> (۴) | <i>Ceratitis capitata</i> (۱)
<i>Eurytoma plotnikovi</i> (۳) |
|--|---|
- ۸۹ کفشدوزک استرالیایی، از دشمنان طبیعی کدام حشره است؟
- | | |
|--|--|
| <i>Lymantria dispar</i> (۲)
<i>Synanthedon tabaniformes</i> (۴) | <i>Cossus cossus</i> (۱)
<i>Icerya purchasi</i> (۳) |
|--|--|

- | | | |
|------|---|---|
| -۹۰ | گردآلو دشدن اندام‌های درخت، از علایم خسارت کدام آفات است؟ | (۱) زنجره‌ها
(۲) سپردارها
(۳) شته‌ها
(۴) کنه‌ها |
| -۹۱ | خسارت کدام گونه، نفوذ قارچ‌ها و باکتری‌های موولد پوسیدگی غده پیاز را تسهیل می‌کند؟ | (۱) <i>Pegomya betae</i>
(۲) <i>Rhyzoglyphus robini</i>
(۳) <i>Delia antiqua</i>
(۴) <i>Rhyzoglyphus echinopus</i> |
| -۹۲ | فعالیت کدام چوبخوار درختان میوه، می‌تواند روی درختان سالم ملاحظه شود؟ | (۱) <i>Sphenoptera davatchii</i>
(۲) <i>Capnodis tenebriocosa</i>
(۳) <i>Synanthedon myopaeformis</i> |
| -۹۳ | خمیر آنتی تارلو در کنترل کدام آفت قابل استفاده است؟ | (۱) ابریشم باف ناجور
(۲) کرم خراط
(۳) سوسک شاخص دراز
(۴) سوسک پنتادون |
| -۹۴ | بید لیاس (Tineola biselliella) روی کدام محصول، بیشترین تغذیه و خسارت خود را اعمال می‌کند؟ | (۱) ابریشم مصنوعی
(۲) مواد سلولزی
(۳) منسوجات پشمی
(۴) منسوجات نخی |
| -۹۵ | لاروهای کک پنبه از کدام قسمت گیاه، تغذیه می‌نمایند؟ | (۱) برگ
(۲) ساقه
(۳) طوقه
(۴) قوزه |
| -۹۶ | به کدام گونه، سرخ‌وطومی تخدمان با بذر یونجه گفته می‌شود؟ | (۱) <i>Apion aestivum</i>
(۲) <i>Anthonomus grandis</i>
(۳) <i>Sitona puncticollis</i>
(۴) <i>Eurytoma rodii</i> |
| -۹۷ | شته‌های بالدار سبب در بهار و تابستان، چه افرادی را تولید می‌کنند؟ | (۱) بی‌بال
(۲) بالدار
(۳) بالدار و بی‌بال
(۴) بی‌بال و بی‌بال |
| -۹۸ | کدام ملخ، تنها به صورت مهاجر خارج از ایران، به عوشه‌های کشو حمله می‌کنند؟ | (۱) آسیایی
(۲) ایتالیایی
(۳) مراکشی
(۴) صحراوی |
| -۹۹ | خسارت کدام یک از شته‌های زیر، منحصرًا روی ریشه گندم، مشاهده می‌شود؟ | (۱) <i>Tetraneura ulmi</i>
(۲) <i>Schizaphis graminum</i>
(۳) <i>Diuraphis noxia</i>
(۴) <i>Sitobion avenae</i> |
| -۱۰۰ | کدام یک از آفات برنج در مناطق شمالی ایران غالباً از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ | (۱) زنجرک سبز برنج
(۲) ساقه‌خوار برنج
(۳) شب‌پره تکنقطه‌ای برنج
(۴) کرم سبز برگ‌خوار برنج |

اصول میارزه و سمشناسی در آفات گیاهی:

- ۱۰۱- از منظر اکولوژی و میزان خسارت آفات، کدام پدیده، خطرناک‌تر است؟

 - (۱) طغیان آفات ثانوی
 - (۲) طغیان مجدد آفات
 - (۳) مقاومت حشرات به آفت‌کش‌ها
 - (۴) از بین رفتن موجودات غیرهدف

۱۰۲- مقایسه دو اکوسیستم زراعی و طبیعی از دیدگاه تولید مثل و مرگ و میر حشرات، کدام درست است؟

۱) ثبات و برقراری گونه در اکوسیستم طبیعی کم و در اکوسیستم زراعی زیاد است.

۲) روابط متقابل گونه ها و جمعیت ها در اکوسیستم طبیعی کم و در اکوسیستم زراعی زیاد است.

۳) همزیستی در اکوسیستم زراعی غیرقابل تحمل، و در اکوسیستم طبیعی قابل تحمل و مفید است.

۴) نگهداری و ذخیره مواد غذایی در اکوسیستم طبیعی خیلی زیاد و در اکوسیستم زراعی خیلی کم است.

۱۰۳- در خصوص رقابت ایدایی، «Contest Competition» و «Scramble Competition» و رقابت واقعی کدام مورد درست است؟

۱) رقابت واقعی منجر به «تشدید بهره برداری» بیش از حد از زیستگاه می شود.

۲) رقابت واقعی نسبت به رقابت ایدایی منجر به تولید جمعیت با ثبات و پایدارتری می شود.

۳) در رقابت واقعی منابع محدود به طور یکسان (یا تقریباً برابر) مورد بهره برداری افراد قرار می گیرد.

۴) در رقابت ایدایی چون منابع حیاتی به طور غیرمساوی بین افراد تقسیم می شود، بنابراین تعدادی از افراد کاملاً موفق و تعدادی دیگر ناموفق هستند.

۱۰۴- کلام مورد معرف «Gain threshold» است؟

۱) کمترین تعداد آفت که بجای خسارت اقتصادی نماید.

۲) سطحی از ایتوهی جمعیت آفت که قابل کنترل است.

۳) شروع خسارت اقتصادی اگر لازم است عملیات کنترل آغاز شود.

۴) پایین ترین سطح خسارت است که بتوان آن را اندازه گیری نمود.

۱۰۵- کدام مورد درست است؟

۱) غالباً برای سوسک ها از فرمون جنسی و برای مسببه ها از فرمون تجمیعی استفاده می کنند.

۲) فرمون تجمیعی معمولاً توسط Scolytidae (تولید می گردد) و یک تأثیر خاص در آن به نام «تأثیر گروهی» یافت می شود.

۳) در دنیای حشرات، غالباً ماده ها قبل از جفت گیری با فراخوانی (Call song)، حشره نر را جلب کرده و نر نیز تولید فرمون کرده و ماده را تحریک می کند.

۴) حشرات ماده در هنگام جفت گیری صدایی تولید می کنند (Call song) (آن را ماده ها به نر آنها نزدیک نشوند).

۱۰۶- موفقیت کدام یک از عوامل کنترل بیولوژیک بیشتر به هم زمانی بین مرحله رشدی آفت و دشمن طبیعی وابسته است؟

۱) پارازیتوئیدها

۲) پاتوژن ها

۳) سن ها

۴) بالتوری ها

۴) شکار گرها

۱۰۷- به منظور ریشه کنی یک آفت مهاجم، کدام روش منجر به ریشه کنی سریع تر (در تعداد نسل کمتر افت) خواهد شد؟

۱) رهاسازی نر و ماده های عقیم

۲) رهاسازی ماده های عقیم همراه با تله های نوری

۳) رهاسازی نر های عقیم همراه با یک حشره کش گیاهی

۴) کاهش جمعیت آفت با حشره کش و سپس رهاسازی نر های عقیم

۱۰۸- تغییر در کدام عامل می تواند موجب تغییرات شدیدتری در سطح زیان اقتصادی یک گونه حشره آفت روی یک گونه محصول شود؟

۱) بهداشت مزرعه در اوایل فصل

۲) زمان ایجاد خسارت و مرحله رشدی گیاه

۳) عملیات خاک ورزی

۱۰۹- ترکیبات فنولی که پس از حمله حشرات یا عوامل بیماری‌زا در گیاهان تولید می‌شوند و در مقاومت القایی گیاهان در برابر آفات نقش دارند، چه نامیده می‌شوند؟

- (۱) phytoalexins (۲) allelochemicals
 (۳) secondary metabolites (۴) semiochemicals

۱۱۰- کفشدوزک «*Vedalia cardinalis*»، چه نوع شکارگری است؟

- (۱) تکخواره
 (۲) چندخواره

(۳) تخمهای گونه‌های خانواده کفشدوزک‌ها را شکار می‌کند.


(۴) فقط لاروهای سن ۱ و ۲ خانواده Pyralidae را شکار می‌کند.

۱۱۱- تأثیر دی‌فلوبنزورون (دی‌میلین) علیه حشرات آفت چگونه است؟

- (۱) تأثیر دورکنندگی دارد.
 (۲) باعث جلب حشره می‌شود.
 (۳) عقیم‌کننده
 (۴) از تشکیل کیتین جلوگیری می‌کند.
 (۵) تأثیر «Apholate» در مدیریت آفات چگونه است؟

- (۱) جلب‌کننده
 (۲) دورکننده

اصول مبارزه و سهم‌شناختی در آفات گیاهی:



3

Sanjesh3

www.Sanjesh3.com

113

۱۱۳- در روغن پاشی، گیاه‌سوزی چه زمانی رخ می‌دهد؟

(۱) ویسکوزیته روغن بالا باشد.

(۲) درصد هیدروکربن‌های اشباع بالا باشد.

(۳) درصد هیدروکربن‌های غیراشباع بالا باشد.

(۴) مقدار باقی‌مانده سولفونه‌نشده (UR) از ۹۲٪ بیشتر باشد.

۱۱۴- متوكسی فنوکساید سبب کدام حالت می‌شود؟

- (۱) بازدارنده بیوسنتز کیتین است.
 (۲) باعث عدم پوست‌اندازی می‌شود.
 (۳) باعث عدم پوست‌اندازی می‌شود.
 (۴) فنوکسی‌کارب

- (۱) ایندوکساقارب

(۲) اتیون

۱۱۵- کدام حشره‌کش، خاصیت سیستمیک دارد؟

(۱) ایندوکساقارب

۱۱۶- یک کشاورز، ۳۰ میلی‌لیتر از یک حشره‌کش $\frac{W}{r} \cdot 40\%$ را در یک سم‌پاش ۲۰ لیتری با آب به حجم رسانده

و می‌پاشد، غلظت محلول حشره‌کش بر مبنای ماده مؤثر، چند میلی‌گرم در لیتر است؟

(۱) ۱۵۰ (۲) ۱۵۰۰ (۳) ۶۰۰ (۴) ۶۰

(۱) ۱۵۰ (۲) ۱۵۰۰ (۳) ۶۰۰ (۴) ۶۰

۱۱۷- کدام مورد بیانگر «کپسانم» است؟

- (۱) آفت‌کش برای کنترل مینوز گوجه‌فرنگی
 (۲) بیمارگری برای کنترل بید سیبازمینی

(۳) بیمارگری برای کنترل سفید بالک

۱۱۸- کدام ترکیب از نظر تأثیر روی حشرات، جزو سوموم فیزیکی نیست؟

(۱) بوریک اسید

(۲) اکسید آلومینیم

(۳) روغن‌ها

(۴) فسفید آلومینیم

- ۱۱۹- کدام ترکیب از منظر تاریخچه آفت‌کش‌ها، قدیمی‌ترین ترکیبی است که به عنوان حشره‌کش استفاده شد؟
- (۱) ازادیراکتین (۲) پیرترین (۳) روتون (۴) نیکوتین
- ۱۲۰- ترکیب مناسب و قابل توصیه برای تریپس غربی گل، کدام است؟
- (۱) سایفلوترون (۲) فلوکساماتامید (۳) فلولالینیت (۴) فلوبن دی آمید
- ۱۲۱- این ترین فرمولاسیون یک آفت‌کش با سمیت بسیار بالا، کدام است؟
- (۱) گرد پاشیدنی (D) (۲) دانه‌ای یا گرانول (G) (۳) مایع قابل امولسیون (EC) (۴) مایع غلیظ سوسپانسیونی (SC)
- ۱۲۲- کدام حشره‌کش، خاصیت کنه‌کشی قابل توجهی دارد؟
- (۱) ایمیداکلورپرید (۲) پرمترین (۳) اسفیت (۴) فن پروپاترین
- ۱۲۳- اکسی‌دیمتون مدلیل به کدام گروه شیمیایی حشره‌کش‌ها متعلق است؟
- (۱) فسفره (۲) کارباماتی (۳) پایریتروئیدی (۴) نونیکوتینوئیدی
- ۱۲۴- کدام حشره‌کش از ترکیبات پایریتروئیدی است؟
- (۱) توقن پرلاکس (۲) داینتوفوران (۳) کلوتیانیدین (۴) فیپرونیل
- ۱۲۵- کدام حشره‌کش برای کنترل پسیل گلابی توصیه می‌شود؟
- (۱) سایرومازین (۲) الوفوران (۳) فلونیکامید (۴) لمداسایه‌الوترون