

تعداد سوال: نسخه ۲۶ نكمبلي -- تشربيع ۶  
زمان امتحان: تستي و نكمبلي ۶۰ لفته تشربيع ۶۰ لفته  
تعداد کل صفحات: ۱۰

نام درس: کاربرد طيفستنجي در شيمي آلى  
رشتناكمبلي-گريش: شيمي (محض و کاربردي)  
کد درس: ۱۱۱۴۰۴۰

\* استفاده از ماشين حساب مجاز است.

۱. دراير جذب انرژي اشعه ماوراء بنيش و مرئي توسط مولکول چه نوع انتقالی صورت مى گيرد؟
  - الف. شکستن اتصال
  - ب. انتقال الکترون
  - ج. حرکت ارتعاشی
  - د. حرکت يا انتقال چرخشی
۲. با توجه به اطلاعات زير کدام گزينه عدد موجي محاسبه شده را برای پيووند  $C - D$  به طور صحيح نشان مى دهد؟

$$K = 5 \times 10^5 \frac{\text{dyne}}{\text{cm}} \quad , \quad M_C = 12 \quad , \quad M_D = 2 \quad , \quad \bar{v} = 4 / 12 \sqrt{\frac{K}{M}}$$

- الف. ۲۲۰۶      ب. ۳۰۰۰      ج. ۱۶۸۲      د. ۱۳۴۰
۳. طيف  $C = CH$  اجفت شده با پروتون برای گروه  $CHD_2$  - چند خط طيفي خواهد بود؟
    - الف. ۴ خط طيفي
    - ب. ۵ خط طيفي
    - ج. ۷ خط طيفي
    - د. ۱۰ خط طيفي
  ۴. فركانس جذبي گروه کربونيل در کدام تركيب بيشترین است؟



۵. تشخيص سريع آميدهای ساده از  $N - H$  - استخلافی در طيف  $IR$  مى تواند از:

الف. جذب  $N - H$  در آميد ساده به صورت دو نوار

ب. از تفاوت در موقعیت جذب  $C = O$  آنها

ج. از موقعیت جذب  $C - N$

د. از بررسی ناحيه  $cm^{-1}$  ۱۰۰۰ به پايين انجام شود.

۶. در طيف  $IR$  در مورد آلنها:

الف. پيكهای عموماً قوى در ناحيه  $cm^{-1}$  ۱۰۰۰-۶۵۰ مى دهد.

ب. تشخيص  $cis$ ,  $trans$  بودن امكان پذير است.

ج. به کارگيري ارتعاشات خارج صفحه ای برای اثبات ساختمان تک استخلافی بسيار مطمئن است.

د. همه موادر فوق

نام درس: کاربرد طیف‌سنجی در شیمی آلی

رشته تحصیلی-گرایش: شیمی (محض و کاربردی)

کد درس: ۱۱۱۴۰۴۰

تعداد کل صفحات: ۱۰

تعداد سوال: نسخه ۲۶ تکمیلی -- تشریعی ۶

زمان امتحان: تستی و تکمیلی ۶۰ لفته تشریعی ۶۰ لفته

۷. کدامیک از عبارت‌های زیر صحیح است؟

الف. اگر یک ارتعاش اصلی با یک جذب اورتون یا ترکیبی ادغام گردد، ارتعاش حاصل را اورتون می‌گویند.

ب. ارتعاشات خمثی همواره در فرکانس‌های بالاتری نسبت به ارتعاشات کششی ظاهر می‌شوند.

ج. ارتعاشات نامتقارن همواره در فرکانس بالاتری نسبت به ارتعاش کششی متقارن ظاهر می‌شوند.

د. مزدوج شدن یک پیوند دوگانه با پیوند دوگانه  $C=C$  دیگر خصلت پیوند دوگانه را بیشتر کرده و فرکانس جذب در  $IR$  را افزایش می‌دهد.

۸. انتقال انرژی تابش ورودی به هسته در پدیده رزونانس مغناطیسی هسته در چه صورت انجام می‌شود؟

الف. برابری فرکانس میدان الکتریکی تابش با فرکانس میدان مغناطیسی دستگاه

ب. برابری فرکانس میدان الکتریکی تابش با فرکانس میدان الکتریکی حاصل از اسپین هسته

ج. برابری فرکانس میدان الکتریکی تابش با فرکانس میدان مغناطیسی حاصل از اسپین هسته

د. گزینه الف و ج

۹. تغییر مکان شیمیایی پروتونی که دارای رزونانس  $TMS$  در دستگاه  $HRZ$  ۱۲۸ از  $MHZ$  است بر حسب کدام گزینه صحیح است؟ ( $\delta$ ) ppm

۴/۰۱




۱/۰۱

۲/۱۳

۳/۱۳

الف. ترکیب یک استر با فرمول  $C_6H_8O_2$  است. ساختمن آن با توجه داده‌های زیر کدام است؟

$$\delta = 1/2 \text{ (triplet)} , \quad \delta = 4/2 \text{ (quartet)} , \quad \delta = 2/0 \text{ (singlet)}$$



۱۱. ثابت کوپلاژ در پروتون‌های مشخص شده در کدام ترکیب بیشتر است؟



نام درس: کاربرد طیف‌سنگی در شیمی آلی






رشته تحصیلی-گرایش: شیمی (محض و کاربردی)

کد درس: ۱۱۱۴۰۴۰


تعداد سوال: نسخه ۲۶ تکمیلی -- تشریعی ۶

زمان امتحان: تستی و تکمیلی ۶۰ لفته تشریعی ۶۰ لفته

تعداد کل صفحات: ۱۰

۱۲. پروتون‌های  $A$ ,  $B$  در کدام ترکیب به عنوان هیدروژن‌های دیاستروتوپی نامیده می‌شوند؟

۱۳. کدام عبارت در مورد ترکیب مقابله صحیح است؟

الف. پروتون‌های  $B$ ,  $A$  معادل شیمیایی و مغناطیسی هستند.ب. پروتون‌های  $B$ ,  $A$  از نظر شیمیایی و مغناطیسی معادل نیستند.ج. پروتون‌های  $B$ ,  $A$  از نظر شیمیایی معادل ولی از نظر مغناطیسی معادل نیستند.د. پروتون‌های  $B$ ,  $A$  از نظر مغناطیسی معادل و از نظر شیمیایی معادل نیستند.۱۴. در مولکول در طیف‌سنگی  $^1H NMR$  کدام عبارت زیر صحیح است؟الف. هیدروژن‌های  $-CH_{\mu}$  شماره ۱ در میدان بالاتری نسبت به  $-CH_{\mu}$  شماره ۲ ظاهر می‌شوند.ب. هیدروژن‌های  $-CH_{\mu}$  شماره ۱ در میدان پایین‌تری نسبت به  $-CH_{\mu}$  شماره ۲ ظاهر می‌شود.

ج. هیدروژن‌های دو گروه متیلن ۱ و ۲ در میدان نابرابر ظاهر می‌شوند.

د. ۱ و ۳ هر دو صحیح هستند.

۱۵. در طیف‌سنگی  $^{13}C NMR$  ۱ طیف واجفت شده از پروتون سیکلوهگزانول چند طیف برای کربن‌ها ظاهر می‌شود؟

د. ۳

ج. ۵

ب. ۶

الف. ۴

۱۶. کرموفور چیست؟

الف. استخلاف‌هایی که شدت جذب را افزایش می‌دهند.

ب. تغییر مکان به فرکانس بالاتر یا طول موج کوتاه‌تر را می‌گویند.

ج. گروهی از اتم‌ها که سبب انرژی انتقال و طول موج پرتو جذب شده می‌شوند.

د. گروهی که سبب تغییر مکان قرمز یا فرکانس پایین در طیف‌سنگی  $11.7$  می‌گردد.

تعداد سوال: نسخه ۲۶ نكمبلي -- تشربي ۶  
زمان امتحان: تستي و نكمبلي ۶۰ لفته تشربي ۶۰ لفته  
تعداد کل صفحات: ۱۰



نام درس: کاربرد طيفسننجي در شيمي آلى  
رشته تحصيلي-گرایش: شيمي (محض و کاربردي)  
کد درس: ۱۱۱۴۰۴۰

۱۷. شدت جذب در  $I.R$ :

- الف. بستگي به قدرت اتصال دارد.  
ب. بستگي به عدم تقارن الکتروني يك گروه دارد.  
ج. بستگي به اندازه طول موج دارد.

۱۸. کدام عبارت زير صحیح است؟ (در طيفسننجي  $\text{U.V}$ )

- الف. انتقالات از نوع  $\pi^* \rightarrow \pi$  توسط حلالي قطبی به طول موج های کوتاهتر منتقل می شوند.  
ب. انتقالات از نوع  $\pi^* \rightarrow \pi$  توسط حلالي قطبی به طول موج های کوتاهتر منتقل می شوند.  
ج. حلالي مناسب حلالي هاستند که در ناحيه  $\text{U.V}$  جذب داشته باشند.  
د. سلول نمونه باید از ماده ای ساخته شده باشد که نور ناحيه  $\text{U.V}$  را فقط جذب نماید.

۱۹.  $\lambda_{\max}$  کدام ترکيب در طيفسننجي  $\text{U.V}$  بيشتر است؟

انون حلقوي شش عضوي  $\lambda_r = 215$

پيوند دوگانه اضافي  $\lambda_r = 350$

دی ان هموسيکلی  $\lambda_r = 39$

باقيمانده حلقة  $\lambda_r = 18$

۳۰۲. د

۳۵۵. ج

۲۵۱. ب

۲۴۹. الف.

۲۱. نواريي مك لافرتی در مولکول بوتيل بنزن در طيفسننجي جرمی منجر به تشکيل پيك با  $\frac{m}{z} = ?$  می گردد؟

$$\frac{m}{z} = 134$$

$$\frac{m}{z} = 92$$

$$\frac{m}{z} = 57$$

$$\frac{m}{z} = 78$$

۲۲. قدرت تفکیک دستگاهی که قادر باشد دو قله با جرم های  $50/0.05$ ،  $50/0.005$  را از هم تشخیص دهد برابر چند است؟

۵۰۰۵. د

۱۰۱۱/۱. ج

۱۰۱۱. ب

۵۰۵. الف.

۲۳. هرگاه يك عنصر تقارن (صفهه يا محور) از مولکول هايي که پيوند دوگانه دارند عبور کند، طيف  $H.N.M.R$  آنها داري کدام مشخصه زير است؟

- ب. شکاف سيس و ترانس مشاهده نمي شود.  
د. فقط شکاف سيس را نشان مي دهد.

- الف. شکاف سيس و ترانس مشاهده مي شود.  
ج. فقط شکاف ترانس دیده مي شود.

نام درس: کاربرد طیف‌سنگی در شیمی آلی

رشته تحصیلی-گرایش: شیمی (محض و کاربردی)

کد درس: ۱۱۱۴۰۴۰

تعداد سوال: نسخه ۲۶ تکمیلی -- تشریعی ۶

زمان امتحان: تستی و تکمیلی ۶۰ لفته تشریعی ۶۰ لفته

تعداد کل صفحات: ۱۰

۲۴. در یک طیف جرمی اگر جرم یون اولیه برابر ۱۲۰ و جرم قطعه یونی جدید برابر ۶۰ باشد جرم ظاهری یون پایدارنما در طیف برابر است با:

د. ۳۰

ج. ۴۵

ب. ۹۰

الف. ۶۰

۲۵. قطعه یونی  $\frac{m}{e} = 29$  در طیف جرمی کامیک از ترکیبات زیر زیاد دیده می‌شود؟

ب. اسیدهای کربوکسیلیک

الف. آلدہیدها

د. استرها

ج. کتونها

۲۶. پیک پایه در مورد سه ایزومر زایلن  $[_{\mu}(CH_4)(CH_3)C]$  در طیف سنگی جرمی کدام است؟

ب. پیک  $M - 15$  است.الف. پیک یون مولکولی است ( $M^+$ )د. پیک  $M + 1$  است.ج. پیک  $M - 1$  است.

### «و<sub>ا</sub>لات تشریح»

۱. طیف‌های مادون قرمز سیس و ترانس-۳-هگزن-۱-أُل به صورت نشان داده شده در شکل ۱ و ۲ می‌باشد. با تفسیر کامل ساختمان هر یک را گمارش کنید.

۲. فرمول این ترکیب  $C_6H_{12}O_{\mu}$  است. ساختمان آنرا از روی طیف‌های داده شده در شکل‌های ۳ و ۴ و ۵ مشخص سازید.

۳. طیف U.V این ترکیب هیچ جذب ماقزیمی را در بالای ۲۰۵ nm نشان نمی‌دهد. ساختمان آن را از روی طیف‌های داده شده در شکل‌های ۶ و ۷ و ۸ مشخص سازید.


۴. این ترکیب دارای فرمول مولکولی  $C_{10}H_9NO_{\mu}$  است. ساختمان آن را از روی طیف‌های داده شده شکل‌های ۹ و ۱۰ و ۱۱ مشخص سازید.

تعداد سوال: نسخه ۲۶ نكمبلي -- تشربيع ۶  
 زمان امتحان: تستي و نكمبلي ۶۰ لفته تشربيع ۶۰ لفته  
 تعداد کل صفحات: ۱۰

نام درس: کاربرد طيفسننجي در شيمي آلى  
 رشته نكمبلي-گريش: شيمي (محض و کاربردي)  
 کد درس: ۱۱۱۴۰۴۰

۵. طيف‌های جرمی حاصل از جزء به جزء شدن بنزیل الكل و آنيلین در طيفسننجي جرمی کدامند، ضمن مشخص نمودن پيك مادر، یون‌های حاصل از قطعه قطعه شدن را نيز بنويسيد.

۶.  $\lambda_{max}$  ترکيبات زير را با استفاده از اطلاعات داده شده بدست آوريد.



$$\lambda_{max} = 230 \text{ nm} \quad \text{مادر}$$

افزايش پيوند دوگانه اضافي ۳۰

استخلاف آلكيل يا باقيمانده حلقه ۵

پيوند دوگانه اگزوسيكى ۵

$$45 \quad \rho - NH - C - CH_3$$


$$7 \quad m, o \quad O - CH_3$$

$$25 \quad \rho$$

نام درس: کاربرد طیف‌سنجی در شیمی آلی  
رشته تحصیلی-گرایش: شیمی (محض و کاربردی)

کد درس: ۱۱۱۴۰۴۰

تعداد سوال: نهشی ۲۶ تکمیلی - تشرییع ۶  
زمان امتحان: نهشی و تکمیلی ۶۰ دقیقه تشرییع ۶۰ دقیقه  
تعداد کل صفحات: ۱۰






پیام رسانی برای سوالات:  
شامل می‌شوند:

نام درس: کاربرد طیف‌سنجی در شیمی آلی  
رشته تحصیلی-گرایش: شیمی (محض و کاربردی)

کد درس: ۱۱۱۴۰۴۰

تعداد سوال: نهشی ۲۶ تکمیلی - تشرییع ۶  
زمان امتحان: نهشی و تکمیلی ۶۰ دقیقه تشرییع ۶۰ دقیقه  
تعداد کل صفحات: ۱۰



دکل ۵:

دکل ۳:


دکل ۲:

ضیمه موطب سوال در:


تعداد سوال: نسخه ۲۶ نكمبلي - تشربي ۶  
 زمان امتحان: تستي و نكمبلي ۶۰ لفته تشربي ۶۰ لفته  
 تعداد کل صفحات: ۱۰

نام درس: کاربرد طيف‌ستنجي در شيمي آلى  
 رشتا نصبابي-گريش: شيمي (محض و کاربردي)  
 کد درس: ۱۱۱۴۰۴۰


ضمينه مربرط برعوال ۳:



شکل ۶:




شکل ۷:




شکل ۸:

نام درس: کاربرد طیف‌سنجی در شیمی آلی  
رشته تحصیلی-گرایش: شیمی (محض و کاربردی)  
کد درس: ۱۱۱۴۰۴۰


تعداد سوال: نسخه ۲۶ تکمیلی - تشرییع ۶  
زمان امتحان: نسخی و تکمیلی ۶۰ دقیقه تشرییع ۶۰ دقیقه  
تعداد کل صفحات: ۱۰



عمل ۱۱:



عمل ۱۰:



عمل ۹:

- نموده را به مراتع اول